

Sierpiński's Stabilitets Lemma (1.6)

$$D, G \subseteq 2^2 \quad (D, G \neq \emptyset), \quad G \subseteq D$$

D er $(\alpha, \beta, \dots)$ stabil $\alpha, \beta, \dots$ er mængdeoperationer (forskellig fra $\subset$)

$D_0 :=$ den mindste $(\alpha, \beta, \dots)$ stabile kollektion indeholdende G

Da gælder:

$$(1) \quad G \subseteq D_0 \subseteq D, \quad \text{og} \dots$$

Antag $\forall G, G' \in G : G \cap G' \in D_0$ da gælder

$$(2) \quad D_0 \text{ er } (nf, \alpha, \beta, \dots) \text{-stabil}$$

Antag, at for hver mængdeoperation γ i $(\alpha, \beta, \dots)$ optræder γ^c (den komplementære mængdeoperation) i $(\alpha, \beta, \dots)$, $\forall G \in G : G^c \in D_0$,
da gælder

$$(3) \quad D_0 \text{ er } (C, \alpha, \beta, \dots) \text{-stabil}$$

specielt gælder at hvis $(\alpha, \beta) = (Uc, nc)$ at $D_0 = \sigma(G)$ og
hvis $(\alpha, \beta) = (Uf, nf)$ at $D_0 = \kappa(G)$.

Under de to ovenstående antagelse gælder

$$(4) \quad D_0 \text{ er } (nf, C, \alpha, \beta, \dots) \text{-stabil}$$

og $\kappa(G) \subseteq D_0$, specielt gælder hvis $(\alpha, \beta) = (\uparrow, \downarrow) : D_0 = \sigma(G)$

Beweis:

1) $\mathcal{J} \in \mathcal{D}_0$, pr. def. af $\mathcal{D}_0$

$\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{D}$ idet $\mathcal{D}_0$ og $\mathcal{D}$ er $(\alpha, \beta, \dots)$ -stabile brolegninger indeholdende $\mathcal{J}$, og pr. def. af $\mathcal{D}_0$ som den mindste (se 1.5.1) brolegning med disse egenskaber $\square$

2)

Antag $\forall G, G' \in \mathcal{J} : G \cap G' \in \mathcal{D}_0$ (*)

Definer $\mathcal{J}_A := \{B \in \mathcal{R} \mid B \cap A \in \mathcal{D}_0\}$, $\forall A \subseteq \Sigma$

Da $\mathcal{D}_0$ er $(\alpha, \beta, \dots)^{(*)}$ -stabil følger, jvf. de 'distributive love' for mængdeoperationer, at $\mathcal{J}_A$ er $(\alpha, \beta, \dots)$ -stabil ...

$\cap$: $\hat{A}, \tilde{A} \in \mathcal{J}_A$ $(\hat{A} \cap \tilde{A}) \cap A = (\hat{A} \cap A) \cap (\tilde{A} \cap A) \in \mathcal{D}_0$ da $\mathcal{D}_0$ er $\cap$ -stabil $\square$

$\cup$: $\hat{A}, \tilde{A} \in \mathcal{J}_A$ $(\hat{A} \cup \tilde{A}) \cap A = (\hat{A} \cap A) \cup (\tilde{A} \cap A) \in \mathcal{D}_0$ da $\mathcal{D}_0$ er $\cup$ -stabil $\square$

$\setminus$: $\hat{A}, \tilde{A} \in \mathcal{J}_A$ $(\hat{A} \setminus \tilde{A}) \cap A = (\hat{A} \cap A) \setminus (\tilde{A} \cap A) \in \mathcal{D}_0$ da $\mathcal{D}_0$ er $\setminus$ -stabil $\square$

$-$: $\hat{A}, \tilde{A} \in \mathcal{J}_A$, $\hat{A} \subseteq \tilde{A}$ $(\tilde{A} - \hat{A}) \cap A = (\tilde{A} \cap A) - (\hat{A} \cap A) \in \mathcal{D}_0$, da $\mathcal{D}_0$ er $-$ -stabil $\square$

$\uparrow$: $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{J}_A$, $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, $A_n \uparrow \hat{A}$ $(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \uparrow \hat{A} \cap A \in \mathcal{D}_0$, $\mathcal{D}_0 \uparrow$ -stabil $\square$

$\downarrow$: $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{J}_A$, $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, $A_n \downarrow \hat{A}$ $(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \cap A = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \downarrow \hat{A} \cap A \in \mathcal{D}_0$, $\mathcal{D}_0 \downarrow$ -stabil $\square$

$\cup c$: $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{J}_A$ $(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \in \mathcal{D}_0$, da $\mathcal{D}_0$ er $\cup c$ -stabil $\square$

$\cap c$: $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{J}_A$ $(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \cap A = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \in \mathcal{D}_0$, da $\mathcal{D}_0$ er $\cap c$ -stabil $\square$

Σf : $\hat{A}, \tilde{A} \in \mathcal{J}_A$, $\hat{A} \cap \tilde{A} = \emptyset \Rightarrow (\hat{A} \cap A) \cap (\tilde{A} \cap A) = \emptyset$ $(\hat{A} \cup \tilde{A}) \cap A = (\hat{A} \cap A) \cup (\tilde{A} \cap A) \in \mathcal{D}_0$, da $\mathcal{D}_0$ Σf -stabil $\square$

Σc : $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{J}_A$, $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) = \emptyset$, $(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \in \mathcal{D}_0$, da $\mathcal{D}_0$ er Σc -stabil $\square$

C må ikke være i listen $(\alpha, \beta, \dots)$ da $\mathcal{D}_0$ C -stabil $\nRightarrow \mathcal{J}$ C -stabil

Models.:

$\hat{A}^c$

 $\hat{A} \in \mathcal{J}_A$ dvs. $\hat{A} \cap A \in \mathcal{D}_0$, $(\hat{A} \cap A)^c = \hat{A}^c \cup A^c \in \mathcal{D}_0$

$\dagger$ $\alpha, \beta, \dots$ forskellig fra C

Sæt $G=A$ i $*$ -antagelsen, da er det klart, at $\forall A \in \mathcal{G} :$

$$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}_A$$

Vi har desuden lige vist, at $\mathcal{I}_A$ er $(\alpha, \beta, \dots)$ -stabil, af 1.5.1 følger

$$\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{I}_A, \forall A \in \mathcal{G}$$

Da $\cap$ er en kommutativ mængdeoperation ses $A \in \mathcal{I}_B \iff B \in \mathcal{I}_A$

$$\text{Lad } B \in \mathcal{D}_0 \Rightarrow B \in \mathcal{I}_A, \forall A \in \mathcal{G} \Rightarrow A \in \mathcal{I}_B, \forall A \in \mathcal{G} \Rightarrow \mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}_B$$

$$\text{Dvs.} \quad \mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}_B, \forall B \in \mathcal{D}_0$$

$\mathcal{I}_B$ er $(\alpha, \beta, \dots)$ -stabil og derfor følger af (1.5.1), at $\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{I}_B, \forall B \in \mathcal{D}_0$

Dvs. $A, B \in \mathcal{D}_0 : A \cap B \in \mathcal{D}_0$, dvs $\mathcal{D}_0$ er $\cap$ -stabil $\square$

3)

Antag at for hver af mængdeoperationerne, γ i $(\alpha, \beta, \dots)$ optræder γ^c (den komplementære mængdeoperation) i $(\alpha, \beta, \dots)$ og $\forall G \in \mathcal{G} : G^c \in \mathcal{D}_0$ (*)

$$\text{Definer: } \mathcal{D}_1 = \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \in \mathcal{D}_0 \wedge A^c \in \mathcal{D}_0\}$$

Da $\mathcal{D}_0$ er $(\alpha, \beta, \dots)$ -stabil følger at $\mathcal{D}_1$ er $(\mathcal{C}, \alpha, \beta, \dots)$ -stabil

$\mathcal{C}$ -stabiliteten følger af def. på $\mathcal{D}_1$

$$\text{nf: } A, \hat{A} \in \mathcal{D}_1, A \cap \hat{A} \in \mathcal{D}_0, \mathcal{D}_0 \text{ nf-stabil} \quad (A \cap \hat{A})^c = A^c \cup \hat{A}^c \in \mathcal{D}_0 \quad \mathcal{D}_0 \text{ uf-stabil osv.}$$

Pr. antagelse $\Rightarrow$ gælder $\forall G \in \mathcal{G} \subseteq D_0: G^c \in D_0$. Dvs. $\mathcal{G} \subseteq D_1$

Da D_1 er $(\alpha, \beta, \dots)$ -stabil følger af 1.5.1 at $D_0 \subseteq D_1$

Af def. på D_1 har vi $D_0 \supseteq D_1$, dvs. $D_0 = D_1$

Da D_1 er C -stabil er D_0 C -stabil, vi har altså vist

D_0 er $(C, \alpha, \beta, \dots)$ -stabil

Specielt gælder for $(\alpha, \beta) = (v_c, n_c)$ at $D_0 = \sigma(\mathcal{G})$

(n_c, C) -stabilitet $\Rightarrow \mathcal{R} \in D_0$, der sammen med (v_c, C) -stabilitet giver at D_0 er en σ -algebra, da D_0 pr. def. er den mindste (n_c, v_c, C) -stabile σ -algebra på $\mathcal{R}$ indeholdende $\mathcal{G}$, følger det ønskede.

(tilsvarende argument for $(\alpha, \beta) = (u_f, n_f)$ -stabilitet af $D_0 \Rightarrow D_0 = \alpha(\mathcal{G})$)

Man kunne frygte D_0 var 'for stor' men dette er ikke tilfældet, jvf. 1.2.9 og 1.2.10

4) De første resultater følger direkte af 2) og 3); dvs. at D_0 er $(n_f, C, \alpha, \beta, \dots)$ -stabil under antagelse af, at $\forall G, G' \in \mathcal{G}: G^c, G \cap G' \in D_0$ og at for hver mængdeoperation γ_i i $(\alpha, \beta, \dots)$ er den komplementære mængdeoperation γ^c i $(\alpha, \beta, \dots)$

Idet $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$ ser vi, at (n_f, C) -stabilitet medfører u_f -stabilitet. Dvs. specielt er D_0 en algebra indeholdende $\mathcal{G}$. Def. af $\alpha(\mathcal{G})$ giver $\alpha(\mathcal{G}) \subseteq D_0$

Lad $(\alpha, \beta) = (\uparrow, \downarrow)$, ovenstående giver at D_0 er $(C, n_f, \uparrow, \downarrow, u_f)$ -stabil

Lad $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq D_0$, definer $A^n := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \in D_0$, da D_0 er u_f -stabil

$A^n \subseteq A^{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ og $A^\infty := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in D_0$ pr. $\uparrow$ -stabilitet.

Dvs. D_0 er $(C, n_f, \uparrow, \downarrow, u_f, u_c)$ -stabil og specielt en σ -algebra

indeholdende g . Af 1.2.10 og 1.5.1 følger $D_0 = \sigma(g)$
 $\square$

Den første entydighedssætning. (1.7)

μ_1, μ_2 betegner to mål på σ -algebraen $\mathcal{F}$,

$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ er (μ_1) -stabil ($\mathcal{G} \subseteq 2^{\mathcal{X}}, \mathcal{G} \neq \emptyset$)

Lad $F_n \in \sigma(\mathcal{G})$, $n \in \mathbb{N}$ være givne mængder, der opfylder

$$\forall G \in \mathcal{G} \forall n \in \mathbb{N}: \mu_1(F_n \cap G) = \mu_2(F_n \cap G) \quad \text{og}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}: \mu_1(F_n) = \mu_2(F_n) < \infty \text{ samt } \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \Omega$$

Da gælder $\forall H \in \sigma(\mathcal{G}): \mu_1(H) = \mu_2(H)$

Beweis:

Definer $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G} \cap \{\Omega\}$, da $\mathcal{G}$ er (μ_1) -stabil ser vi at $\mathcal{G}_0$ er (μ_1) -stabil

$$\left[\begin{array}{l} A, B \in \mathcal{G}_0: A, B \in \mathcal{G}: A \cap B \in \mathcal{G} \subseteq \mathcal{G}_0 \text{ (pr. } (\mu_1)\text{-stabilitet af } \mathcal{G} \text{ eller} \\ A \in \mathcal{G} \text{ og } B = \Omega \text{ (id. element)) } A \cap \Omega = A \in \mathcal{G} \subseteq \mathcal{G}_0 \text{ eller} \\ A, B = \Omega \text{ og } \Omega \cap \Omega = \Omega \in \mathcal{G}_0 \end{array} \right]$$

Definer desuden

$$D = \{A \in \mathcal{F} \mid \mu_1(A \cap F_n) = \mu_2(A \cap F_n), \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Lad $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq D: A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$.

Vi vil vise, at D er (ΣC) -stabil; med ovenstående notation og pr. def. af D skal vi vise, at $\mu_1((\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap F_n) = \mu_2((\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap F_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$

(da $\mathcal{F}$ er en σ -algebra og μ_1, μ_2 mål på $\mathcal{F}$ giver ovenstående udtryk mening)

Lad $n \in \mathbb{N}$ være givet

$$\begin{aligned} \mu_1 \left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap F_n \right) &= \mu_1 \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap F_n) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_1 (A_n \cap F_n) \\ &\quad \left(i \neq j : \emptyset = A_i \cap A_j \Rightarrow (A_i \cap F_n) \cap (A_j \cap F_n) = \emptyset \right) \\ &\quad \left(\begin{array}{l} \text{+ def. på mål} \\ \text{+ (*)} \end{array} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu_2 (A_n \cap F_n) \stackrel{(*)}{=} \mu_2 \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap F_n) \right) = \mu_2 \left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap F_n \right) \end{aligned}$$

Desuden vil vi vise, at $\mathcal{D}$ er $(-)$ -stabil. Dvs. vi skal vise

$$A, B \in \mathcal{D}, A \subseteq B : \mu_1((B \setminus A) \cap F_n) = \mu_2((B \setminus A) \cap F_n), \forall n \in \mathbb{N}$$

Lad $n \in \mathbb{N}$ være givet

$$\begin{aligned} \mu_1((B \setminus A) \cap F_n) &= \mu_1((B \cap F_n) \setminus (A \cap F_n)) = \mu_1(B \cap F_n) - \mu_1(A \cap F_n) \\ &\quad \begin{array}{l} \mu_1(B \cap F_n) \leq \mu_1(F_n) < \infty \text{ p.g. antagelse} \\ \text{ovs. (1.3.2)} \\ \text{+ 1.3.3} \end{array} \quad (+) \end{aligned}$$

$$\stackrel{AB \in \mathcal{D}}{=} \mu_2(B \cap F_n) - \mu_2(A \cap F_n) \stackrel{(+)}{=} \mu_2((B \cap F_n) \setminus (A \cap F_n)) = \mu_2((B \setminus A) \cap F_n)$$

Alt i alt har vi altså vist, at $\mathcal{D}$ er $(\Sigma, -)$ -stabil.

Da $\forall G \in \mathcal{G}, n \in \mathbb{N} : \mu_1(F_n \cap G) = \mu_2(F_n \cap G)$ ser vi desuden $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{D}$ (antagelse)

Lad $\mathcal{D}_0$ betegne den mindste $(\Sigma, -)$ -stabile brøkkegning (på $\mathcal{R}$)

indeholdende $\mathcal{G}_0$. Da gælder jvf. Sierpinski's stabilitets lemma (1.6.1)

(Idet $\mathcal{G}_0$ er $(\cap f)$ -stabil og indeholdt i $\mathcal{D}_0$), at $\mathcal{D}_0$ er $(\cap f, \Sigma, -)$ -stabil

Da $(\cap f, -)$ -stabilitet $\Leftrightarrow (1)$ -stabilitet (1.2.4) og $(1, \Sigma)$ -stabilitet

$\Rightarrow$ (uc)-stabilitet (1.2.6) ses, at $\mathcal{D}_0$ er $(\cap f, \Sigma, -, 1, \text{uc})$ -stabil

Endvidere har vi $\mathcal{R} \in \mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{D}_0$, dette medfører (p.g. (1)-stabilitet) at

$\mathcal{D}_0$ yderligere er (C) -stabil. Af def. på σ -algebra ser vi således at

$\mathcal{D}_0$ er en σ -algebra indeholdende $\mathcal{G}_0 \supseteq \mathcal{G}$ og dermed (p.g. def. af $\sigma(\mathcal{G})$)

at (jvf. 1.5.1) $\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{D}_0$

Af definitionen på $\mathcal{D}_0$ følger at $\forall H \in \sigma(\mathcal{G}), n \in \mathbb{N} :$

$$\mu_1(H \cap F_n) = \mu_2(H \cap F_n)$$

Lad $H \in \sigma(\mathcal{G})$ være givet, da $\{F_n\}_{n \geq 1} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$, pr. def. fås

$$\mu_1(H) = \mu_1(H \cap \Omega) = \mu_1(H \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)) \stackrel{\text{pr. antagelse}}{=} \mu_1(H \cap (\bigcup_{n=2}^{\infty} (F_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i) \cup F_1))$$

$$= \mu_1((H \cap F_1) \cup [\bigcup_{n=2}^{\infty} ((F_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i) \cap H)])$$

$$= \mu_1(H \cap F_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \mu_1((F_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i) \cap H)$$

pr. def. af mål

$$= \mu_1(H \cap F_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \mu_1(F_n \cap (H \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i))$$

$$= \mu_2(H \cap F_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \mu_2(F_n \cap (H \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i)) = \dots = \mu_2(H)$$

Da $H \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \in \sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{D}$ (jf. 1.2.6)

+ def. af $\mathcal{D}$

□

@ Idet $\sigma(\mathcal{G})$ jo juf. 1.2.10 er stabil under alle mængdeoperationer

Borel σ -algebraen (1.8)

Lad $(\mathcal{R}, d)$ betegne et pseudo-metrisk rum

$\mathcal{F} :=$ mængden af alle lukkede delmængder af $\mathcal{R}$

$\mathcal{G} :=$ mængden af alle åbne delmængder af $\mathcal{R}$

Ud fra def. af lukkede/åbne mængder ser vi da $(\mathcal{R}, d)$ er et pseudo-metrisk rum at $\mathcal{F}$ er $(\cap, \cup)$ -stabil og $\mathcal{G}$ er $(\cup, \cap)$ stabil (bmk. $(\cap, \cup)^c = (\cup, \cap)$)

Da komplementet til en lukket delmængde er åben og omvendt ser vi

$$F \in \mathcal{F} \iff F^c \in \mathcal{G} \quad \text{og} \quad G \in \mathcal{G} \iff G^c \in \mathcal{F}$$

Dette giver, idet en brokøgn. er en σ -algebra hvis den er $(\cup, \cap)$ -stabil, at $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{F})$, $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ hvorefter der af 1.5.1 følger, at $\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$ og $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ og dermed at $\sigma(\mathcal{G}) = \sigma(\mathcal{F})$

Vi definerer nu Borel σ -algebraen (mht. $(\mathcal{R}, d)$)

$$\mathcal{B}(\mathcal{R}) := \sigma(\mathcal{G}) = \sigma(\mathcal{F})$$

Dvs. Borel σ -algebraen er den mindste σ -algebra indeholdende alle åbne/lukkede delmængder af $\mathcal{R}$ (med pseudo-metrikken d). En delmængde af $\mathcal{B}(\mathcal{R})$ kaldes en Borel mængde og siges at være Borel målelig.

(Et indhold/mål på $\mathcal{B}(\mathcal{R})$ kaldes et Borel indhold/mål på $\mathcal{R}$)

Generering af Borel σ -algebraen (1.9)

(Ω, d) betegner et separabelt metrisk rum

Dvs. $\exists D \subseteq \Omega$, D højst tællelig: $\forall w \in \Omega, r \in \mathbb{R}_+ \exists w^* \in D: d(w, w^*) < r$

Antag $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{B}(\Omega)$ betegner en brokkegning på Ω , således at

$\forall w \in \Omega, n \in \mathbb{N} \exists H \in \sigma(\mathcal{H}): b(w, r_{n+1}) \subseteq H \subseteq b(w, r_n)$, hvor

$\{r_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathbb{R}_+$, $r_n \downarrow 0, n \rightarrow \infty$

Da gælder

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\Omega)$$

Beweis:

Da $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{B}(\Omega)$ og $\mathcal{B}(\Omega)$ er en σ -algebra fas pr. def. af $\sigma(\mathcal{H})$, at $\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B}(\Omega)$. Idet $\mathcal{B}(\Omega) :=$ mindste σ -algebra indeholdende alle åbne delmængder af Ω , skal vi derfor vise at en vilkårlig åben delmængde af Ω er indeholdt i $\sigma(\mathcal{H})$, idet vi i givet fald har $\mathcal{B}(\Omega) \subseteq \sigma(\mathcal{H})$ og dermed alt i alt $\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\Omega)$

Lad $G \subseteq \Omega$ betegne en vilkårlig åben delmængde af Ω .

Vi nummererer elementerne i $G \cap D$:

$$G \cap D := \{w_1, w_2, \dots, w_j, \dots\}$$

Da G er åben, $\forall j \geq 1: w_j \in G$ og $r_n \downarrow 0, n \rightarrow \infty$ er

$\sigma(j) := \min \{n \in \mathbb{N} \mid b(w_j, r_n) \subseteq G\}$ veldefineret for alle $j \geq 1$.

Af antagelsen følger

$$\forall j \geq 1 \exists H_j \in \sigma(H) : b(w_j, r_{\sigma(j)+1}) \subseteq H_j \subseteq b(w_j, r_{\sigma(j)}) \quad (+)$$

Da $\sigma(H)$ pr. def. er (U_c) -stabil følger, at $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i \in \sigma(H)$
Hvis $G = \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$ er vi derfor færdige

Lad $w \in G$ være givet

G er åben, dvs $\exists r \in \mathbb{R}_+ : b(w, r) \subseteq G$ og da $r_n \downarrow 0, n \rightarrow \infty$
 $\exists p \in \mathbb{N} : r_{p+1} + r_p \leq r$

$(\mathcal{U}, d)$ var separabelt og dermed $\exists j \geq 1 : d(w, w_j) < r_{p+1} \leq r$

For $w^{**} \in b(w_j, r_p)$ fås af trekantuligheden følgende vurdering

$$d(w, w^{**}) \leq d(w, w_j) + d(w_j, w^{**}) < r_{p+1} + r_p \leq r$$

Dvs $b(w_j, r_p) \subseteq b(w, r) \subseteq G$, af def. på $\sigma(j)$ følger, at $r_p \leq r_{\sigma(j)}$
og dermed, at $w \in b(w_j, r_p) \subseteq b(w_j, r_{\sigma(j)+1}) \subseteq H_j \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$, dvs.
 $G \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$

At $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i \subseteq G$ følger trivielt af def. på $\sigma(j)$ og (+).

□

Borel σ -algebraen på $\mathbb{R}$ og $\mathbb{R}^k$ (1.10)

(mht. den sædvanlige Euklidiske metrik på $\mathbb{R}, \mathbb{R}^k$)

$\mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}_1 := \{]-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_2 := \{]-\infty, a[\mid a \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_3 := \{ [a, \infty[\mid a \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_4 := \{]a, \infty[\mid a \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_5 := \{ [a, b] \mid a, b \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_6 := \{ [a, b[\mid a, b \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_7 := \{]a, b] \mid a, b \in \mathbb{R} \}$$

$$\mathcal{F}_8 := \{]a, b[\mid a, b \in \mathbb{R} \}$$

$\mathbb{Q}$ er tællig og tæt i $\mathbb{R}$ ($\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \text{cl}(\mathbb{Q})$)

Dvs. $\mathbb{R}$ er separabelt

$\uparrow$
(Dedekinds konstruktion af $\mathbb{R}$ på $\mathbb{Q}$)
Fuldstændighedsprincippet

Af 1.2.10 og 1.9 følger derfor, at

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{F}_1) = \dots = \sigma(\mathcal{F}_8)$$

Men vi har dog benyttet appendix 2 - se dette for en mere 'korrekt' konstruktion/bevisførelse.

(Da enhver åbendelmængde af $\mathbb{R}$ kan skrives som tællig forening af åbne kugler/intervaller, dermed fås $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{F}_8)$; $\sigma(\mathcal{F}_8) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ trivial)

Endelige σ -algebra (1.11)

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \subseteq \Omega$$

$$\gamma := \{1, 2, 3, \dots, n\}, \quad \Gamma := 2^\gamma$$

$$N(\omega) := \{j \in \gamma \mid \omega \in A_j\}, \quad \omega \in \Omega \quad (N: \Omega \rightarrow \Gamma)$$

$$A_\delta := \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = \delta\} = \bigcap_{j \in \delta} A_j \cap \bigcap_{j \notin \delta} A_j^c, \quad \delta \subseteq \gamma$$

$$A_\Delta := \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) \in \Delta\} = \bigcup_{\delta \in \Delta} A_\delta, \quad \Delta \subseteq \Gamma$$

Da $\sigma\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ jvf. 1.2.10 er $(\mathcal{N}, \mathcal{C}, \cup\mathcal{C})$ -stabil følger at $\forall \Delta \subseteq \Gamma: A_\Delta \in \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$

Dvs. $\{A_\Delta \mid \Delta \subseteq \Gamma\} \subseteq \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$

Det er klart, at $\exists \Delta_1, \dots, \Delta_n \subseteq \Gamma: A_{\Delta_1} = A_1, \dots, A_{\Delta_n} = A_n$

Da vi desuden har at $\forall \Delta_i, (\Delta_n)_{n \geq 1} \subseteq \Gamma$ har, at

$A_{\Delta_1}, A_{\bigcap_{n=1}^{\infty} \Delta_n} \in \{A_\Delta \mid \Delta \subseteq \Gamma\}$ (dvs. $\{A_\Delta \mid \Delta \subseteq \Gamma\}$ er $(\mathcal{C}, \cup\mathcal{C})$ -stabil)

følger af 1.5.1 at $\sigma\{A_1, \dots, A_n\} \subseteq \{A_\Delta \mid \Delta \subseteq \Gamma\}$

Alt i alt gælder dermed

$$\sigma\{A_1, \dots, A_n\} = \{A_\Delta \mid \Delta \subseteq \Gamma\}$$

Da Γ består af 2^γ delmængder af $\{A_1, \dots, A_n\}$ ser vi, at

$\sigma\{A_1, \dots, A_n\}$ består af $2^\Gamma = 2^{2^\gamma}$ delmængder af $\mathcal{P}\{A_1, \dots, A_n\}$.

σ -algebraen genereret af pkt. mængder (1.12)

Ω betegner en mængde

$$S := \{ \{ \omega \} \mid \omega \in \Omega \}$$

Ud fra ideen der præsenteres i 1.18, er det 'klart', at en sådan konstruktion af $\sigma(S)$ medfører (+ 1.2.10), at

$$\sigma(S) = \{ A \subseteq \Omega \mid A \text{ el. } A^c \text{ er en tællig mængde} \}$$

(se Exc. 1.15, uge 40, TØ nr. 4)

Vi kan definere målet $P(A) = \begin{cases} 0 & A \text{ tællig} \\ 1 & A \text{ overtællig på } \sigma(S) \end{cases}$ (*1)

Den diskrete / Kronecker metrikken på Ω defineres:

$$\delta(\omega_1, \omega_2) = \begin{cases} 0 & , \omega_1 = \omega_2 \\ 1 & , \omega_1 \neq \omega_2 \end{cases} \quad (*2)$$

Vi ser, at $b(\omega, r) = \omega$, $r \in [0, 1]$ $b(\omega, r) = \Omega$, $r \in]1, \infty)$

(når vi ser på åbne kugle i det metriske rum (Ω, δ))

Denne egenskab ved (Ω, δ) medfører at alle delmængder af Ω er åbne.

Af def. på $\mathcal{B}(\Omega)$ har vi altså, at $\mathcal{B}(\Omega) = 2^\Omega$

Er Ω overtællig (f.eks. et åbent interval på den reelle akse),

findes der en delmængde A af Ω , således at både

A, A^c er overtællig (dvs. et åbent interval på den reelle akse)

Dvs. $\mathcal{B}(\Omega) \supsetneq \sigma(S)$ $\wedge$ $\mathcal{B}(\Omega) \not\subseteq \sigma(S)$ for en sådan mængde,

når vi altså benytter den diskrete metrik som

afstandsbegreb. (Husk jo $\mathcal{B}(\Omega) = 2^\Omega$)

Dette er et godt eksempel til at vise forståelse for 1.9 (Ω, δ) -ikke separabelt.

*₁ opfylder 1.15

*₂ opfylder P 5.1-3

'The Counting Measure' (1.13)

Tuf. 1.1.5 fås, at

$$\#(A) = \begin{cases} \text{antal elementer i } A & , A \text{ endelig} \\ \infty & , A \text{ ikke-endelig} \end{cases} \quad , \text{ er et mål på } 2^{\mathbb{Z}}$$

$$\Delta(A) = \begin{cases} 0 & , A \text{ endelig} \\ 1 & , A \text{ ikke-endelig} \end{cases} \quad , \text{ er et indhold på } 2^{\mathbb{Z}} \text{ hvis } \mathcal{Z} \text{ vilk. stor} \\ \text{mål} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \mathcal{Z} \text{ endelig}$$

Mål på $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ (1.14)

Lad $\{p_n\}_{n \geq 1}$ betegne en følge af ikke-negative reelle tal, $(n \in \mathbb{N})$

$$\text{Definer } \mu(A) = \sum_{n \in A} p_n \quad , A \subseteq \mathbb{N} \quad (*)$$

Ud fra 1.1.5 er det klart, at μ er et (evt. ikke endeligt) mål på $\mathbb{N}$

Det er også klart, at hvis $\mu(\{n\}) = p_n$ og μ er et mål, da er $\mu(A)$ givet ved (*).

(bm. $\Delta(A)$ er et indhold på $2^{\mathbb{N}}$, der ikke er et mål)

bm. på s. 17 påstås, at det ikke er muligt at konstruere et endeligt indhold på $2^{\mathbb{N}}$, der ikke er et mål; men at sådanne indhold eksisterer jf. udvalgsaksionet.

Dirac-målet (1.15)

$\mathcal{Z}$ en mængde $c \in \mathcal{Z}$

$$\delta_c(A) := \begin{cases} 0 & , c \notin A \\ 1 & , c \in A \end{cases} \quad , A \subseteq \mathcal{Z}$$

Det er klart, at δ_c opfylder 1.1.5 og derfor er et mål på $2^{\mathcal{Z}}$.

Konstruktion af algebra (1.16)

$$\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega} \quad (\mathcal{F} \neq \emptyset)$$

Definer $\mathcal{F}_1 := \mathcal{F} \cup \{\Omega, \emptyset\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$: $\mathcal{F}_{n+1} := \{A \cup B^c \mid A, B \in \mathcal{F}_n\}$

$$\text{Påstand: } \alpha(\mathcal{F}) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n$$

Bevis: se Exc. 1.11 US uge nr. 39 (TB nr. 3)

$$\text{Definer } \mathcal{F}_0 := \mathcal{F} \cup \{\emptyset, \Omega\} \cup \{F^c \mid F \in \mathcal{F}\}$$

$$\text{Påstand: } A \in \alpha(\mathcal{F}) \iff \exists F_{ij} \in \mathcal{F}_0 : A = \bigcup_{i=1}^n \bigcap_{j=1}^m F_{ij}$$

$$(\text{el.}) \quad \alpha(\mathcal{F}) = \left\{ \bigcup_{i=1}^n \bigcap_{j=1}^m A_{ij} \mid n, m \in \mathbb{N}, A_{ij} \in \mathcal{F} \right\}$$

Bevis: se Exc. 1.12 US uge nr. 39 (TB nr. 3)

Nulmængder og næsten sikre egenskaber (1.19)

Lad $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$ betegne en σ -algebra, μ betegne et mål på $\mathcal{F}$

Elementære i følgende betegn. på Ω betegnes en μ -nulmængde:

$$\mathcal{N}(\mu) := \{N \subseteq \Omega \mid \exists N_0 \in \mathcal{F}; N \subseteq N_0 \wedge \mu(N_0) = 0\}$$

Det er klart, at enhver delmængde af en μ -nulmængde er en μ -nulmængde.

Da et mål på $\mathcal{F}$ specielt er en mængdefunktion, gælder at $\mu(\emptyset) = 0$, dvs. $\emptyset \in \mathcal{N}(\mu)$ (idet $\emptyset \in \mathcal{F}$, da $\mathcal{F}$ er en σ -algebra).

Lad $\{N_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{N}(\mu)$, dvs. $\exists \{N_{0n}\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F} \forall n \geq 1: \mu(N_{0n}) = 0 \wedge N_n \subseteq N_{0n}$

Af 1.4.1 følger $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} N_{0n}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(N_{0n}) = 0$, da $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} N_{0n}$

ser vi derfor, at $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n \in \mathcal{N}(\mu)$, dvs. $\mathcal{N}(\mu)$ er (uc)-stabil.

Lad $p(\omega)$ betegne en hypotese omhandlende et element $\omega \in \Omega$.

Hvis $\exists N \in \mathcal{N}(\mu): p(\omega)$ gælder $\forall \omega \in \Omega \setminus N$, da siges $p(\omega)$ at være μ -næsten sikker. (μ -a.s.)

Hvis $\exists N \in \mathcal{N}(\mu): p(\omega)$ gælder $\forall \omega \in F \setminus N, F \subseteq \Omega$, da siges $p(\omega)$ at være μ -næsten sikker på F . (μ -a.a., $\omega \in F$)

Lad $A, B \subseteq \Omega$, $f, g, f_1, f_2, \dots : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$

Der følger følgende 'betegnelser':

$$A \subseteq B \text{ } \mu\text{-a.s. hviss } A \setminus B \in \mathcal{N}(\mu)$$

$$A = B \text{ } \mu\text{-a.s. hviss } A \Delta B \in \mathcal{N}(\mu)$$

$$f \leq g \text{ } \mu\text{-a.s. hviss } \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) > g(\omega)\} \in \mathcal{N}(\mu)$$

$$f = g \text{ } \mu\text{-a.s. hviss } \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \neq g(\omega)\} \in \mathcal{N}(\mu)$$

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \text{ } \mu\text{-a.s. hviss } \exists N \in \mathcal{N}(\mu) : f_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\omega) \forall \omega \in \Omega \setminus N.$$

$$f_n \uparrow f \text{ } \mu\text{-a.s. hviss } f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \text{ } \mu\text{-a.s. } \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f_n \leq f_{n+1} \text{ } \mu\text{-a.s.}$$

Påstand: $F \subseteq G \text{ } \mu\text{-a.s.} \implies \mu(F) \leq \mu(G) \quad (1.19.4)$

$$F = G \text{ } \mu\text{-a.s.} \implies \mu(F) = \mu(G) \quad (1.19.5)$$

$$\forall n, k \in \mathbb{N} : n \neq k \quad F_n \cap F_k = \emptyset \text{ } \mu\text{-a.s.} \implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n),$$

under antagelse, at $F, G, F_1, F_2, \dots \in \mathcal{F} \quad ((\Omega, \mathcal{F}) \text{ } \textcircled{w})$

Bevis:

$$F \subseteq G \text{ } \mu\text{-a.s.} \text{ dus. } \exists N \in \mathcal{N}(\mu) : F \setminus G = N \quad (*)$$

Da $(\Omega, \mathcal{F}) \text{ } \textcircled{w}$ er $\mathcal{F}$ juf. 1.2.10 $(\cap, \cup)$ -stabil, dus. $F \setminus G, F \cap G \in \mathcal{F}$

$$\text{Af 1.3.1 følger } \mu(F) = \mu(F \setminus G) + \mu(F \cap G) \stackrel{1.3.2}{=} \mu(F \cap G) \leq \mu(G)$$

$F = G \text{ } \mu\text{-a.s.} \text{ dus. } \exists N \in \mathcal{N}(\mu) : F \Delta G = N$. Analogt med ovenstående for $\cup$, at $F \setminus G, F \Delta G, G \setminus F, F \cap G \in \mathcal{F}$.

$$\mu(F \setminus G) \stackrel{1.3.2}{\leq} \mu(F \Delta G) = 0, \mu(G \setminus F) \stackrel{1.3.2}{\leq} \mu(F \Delta G) = 0 \implies \mu(F \setminus G) = \mu(G \setminus F) = 0$$

$$\mu(F) \stackrel{1.3.1}{=} \mu(F \Delta G) + \mu(F \cap G) - \mu(G \setminus F) \stackrel{1.3.3}{=} \mu(F \cap G)$$

$$\mu(G) = \mu(F \Delta G) + \mu(F \cap G) - \mu(F \setminus G) = \mu(F \cap G)$$

$$\text{Dus. } \mu(F) = \mu(G)$$

$\forall n, k \in \mathbb{N} : n \neq k \quad F_n \cap F_k = \emptyset \quad \mu\text{-a.s.}$ dvs. $\exists N \in \mathcal{N}(\mu)$ således
 $N = F_n \cap F_k \quad (F_n, F_k \in \mathcal{F} \text{ for vi dermed af 1.3.2, at } \mu(F_n \cap F_k) = 0)$

Af dette følger (jvf. 1.3.2) at alle fællesmængdeinddelser afb.
over i 0 af μ .

Operationer på mål (1.20)

Påstand:

$(\Omega, \mathcal{F}) \text{ @ } \mathbb{M}$, $A \in \mathcal{F}$ $\mu, \nu, \mu_1, \mu_2, \dots$ betegner mål på $\mathcal{F}$
 $a, a_1, a_2, \dots \in \mathbb{R}_+$

Definer for $F \in \mathcal{F} \dots$

$$\kappa(F) := \mu(F) + \nu(F)$$

$$\lambda(F) := a \cdot \mu(F)$$

$$\mu_A(F) := \mu(A \cap F)$$

$$\xi(F) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \mu_n(F)$$

Da er κ, λ, μ_A og ξ mål på $\mathcal{F}$.

Bevis:

Af antagelserne er det klart at κ, λ, μ_A og ξ opfylder 1.1.4.

Vi skal altså vise, at κ, λ, μ_A og ξ opfylder 1.1.5:

Lad $\{F_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$: $\forall n \neq m \in \mathbb{N}: F_n \cap F_m = \emptyset$ være givet.

$$\begin{aligned} \kappa\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) &:= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) + \nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \mu, \nu \text{ mål}}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) + \sum_{n=1}^{\infty} \nu(F_n) \\ &\underset{\substack{\uparrow \\ \text{regulærlig for konvergens}}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) + \nu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \kappa(F_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) &:= a \cdot \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \mu \text{ mål}}}{=} a \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{regulærlig for konvergens}}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} a \cdot \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(F_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_A\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) &:= \mu\left(A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{distributiv lov}}}{=} \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap F_n)\right) \underset{\substack{\uparrow \\ F_n \cap F_m = \emptyset \\ \Rightarrow (A \cap F_n) \cap (A \cap F_m) = \emptyset \\ + \mu \text{ mål}}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_A(F_n) \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \mu_n(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{j=1}^{\infty} \mu_n(F_j) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{regul\ddot{e}rgh\ddot{e}r f\ddot{u}r positive ma\ddot{e}\ddot{s}en}}}{=} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \mu_n(F_j)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}(F_j)$$

□

Mængdefunktioner (1.21)

Lad $\mathcal{F}$ betegne en brokøgning på Ω , således $\emptyset \in \mathcal{F}$.

Lad $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$, hvor $\mu(\emptyset) = 0$ (dvs. μ en mængdefkt. på $\mathcal{F}$)

Der gælder følgende betegnelser (om μ på $\mathcal{F}$)

μ er endelig, hvis $\forall F \in \mathcal{F}: \mu(F) < \infty$

μ er voksende, hvis $\forall F, G \in \mathcal{F}, F \subseteq G: \mu(F) \leq \mu(G)$

μ er superadditiv, hvis $\forall F, F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}, \bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq F, F_i \cap F_j = \emptyset \text{ i } i \neq j:$
$$\sum_{i=1}^n \mu(F_i) \leq \mu(F)$$

μ er subadditiv, hvis $\forall F, F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}, F \subseteq \bigcup_{i=1}^n F_i: \mu(F) \leq \sum_{i=1}^n \mu(F_i)$

μ er σ -subadditiv, hvis $\forall F, F_1, \dots \in \mathcal{F}, F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n: \mu(F) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n)$

μ er additiv, hvis μ er superadditiv og subadditiv på $\mathcal{F}$.

μ er σ -additiv, hvis μ er superadditiv og σ -subadditiv på $\mathcal{F}$.

Jvf. def. på indhold (1.1.2-3) ser vi, at μ er et indhold på $\mathcal{F}$ (antag $\mathcal{F}$ algebra)

hvis μ er additiv. Tilsvarende ses ud fra def. på mål (1.1.4-5) og

beviset for 1.3.8, at μ er et mål på $\mathcal{F}$ (antag $\mathcal{F}$ σ -algebra) hvis μ σ -additiv.

Af beviset for 1.3.8. ses, at hvis μ er superadditiv, da holder 1.3.8.

Det er klart, at...

Enhver superadditiv el. subadditiv mængdefunktion er voksende.

Enhver σ -subadditiv mængdefkt. er subadditiv (da $\mu(\emptyset) = 0$).

Lad $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ betegne to brokøgninger på Ω , og lad $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+, \nu: \mathcal{G} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$ betegne to mængdefunkte.

Antag $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, da siges μ at udvide ν , el. μ kaldes en udvidelse af ν , hvis $\mu(G) = \nu(G)$ for alle $G \in \mathcal{G}$.

De μ -målelige mængder (1.22)

Ω betegner en mængde

$\mu: 2^\Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ betegner en mængdefunktion

Et element i følgende brolegu. på Ω kaldes μ -målelig ($\mathcal{M}(\mu)$) ibetson da $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu)$

$$\mathcal{M}(\mu) := \{M \subseteq \Omega \mid \forall A \subseteq \Omega: \mu(A) = \mu(A \cap M) + \mu(A \setminus M)\}$$

Lad $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$, $\emptyset \in \mathcal{F}$. $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ ($\mu(\emptyset) = 0$)

Definer for alle $A \subseteq \Omega$:

$$\text{Den indre } \mu\text{-mål} = \mu_*(A) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu(F_j) \mid F_1, \dots \text{disjunkte } \in \mathcal{F}, \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \subseteq A \right\}$$

$$\text{Det ydre } \mu\text{-mål} = \mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu(F_j) \mid F_1, F_2, \dots \in \mathcal{F}, A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right\}$$

Lad $\mathcal{G}$ betegne en brolægning på Ω , da siger vi,

at $\mathcal{G}$ approximerer μ på $\mathcal{F}$, hvis

$$\forall F \in \mathcal{F}: \mu(F) \leq \sup \{ \mu_*(G) \mid G \in \mathcal{G}, G \subseteq F \}$$

Carathéodory's Sætning (1.23)

$\mu: 2^{\Omega} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$ betegner en mængdefunktion (dvs. $\mu(\emptyset) = 0$)

Da gælder:

$\mathcal{M}(\mu)$ er en algebra (dvs. $(\cap, \cup)$ -stabil), μ indhold på $\mathcal{M}(\mu)$

Hvis $\{M_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ betegner en følge af disjunkte μ -mælelige mængder, da gælder

$\forall A \subseteq \Omega$:

$$\mu(A \cap (\bigcup_{j=1}^n M_j)) = \sum_{j=1}^n \mu(A \cap M_j)$$

$$\mu(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A \cap M_j) + \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap (\bigcup_{j=n}^{\infty} M_j))$$

Desuden, hvis μ er σ -subadditiv, da er $\mathcal{M}(\mu)$ en σ -algebra, og μ er et mål på $\mathcal{M}(\mu)$.

Hjælpesætning:

Lad $\mu: 2^{\Omega} \rightarrow [0, \infty]$ betegne en mængdefunktion (på Ω).

$B \subseteq C \subseteq \Omega$: $C \setminus B \in \mathcal{M}(\mu)$

Da gælder $\forall A \subseteq \Omega$: $\mu(A \cap B) \leq \mu(A \cap C)$

Bevis:


$$\mu(A \cap B) \underset{B \subseteq C}{=} \mu((A \cap C) \setminus (C \setminus B))$$

$$\underset{\mu: 2^{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}_+}{\leq} \mu((A \cap C) \setminus (C \setminus B)) + \mu((A \cap C) \cap (C \setminus B))$$

$$= \mu(A \cap C)$$

$C \setminus B \in \mathcal{M}(\mu)$

□



Bevis for Carathéodory's sætning:

For at vise, at $\mathcal{M}(\mu)$ er en algebra, skal vi vise, at $\mathcal{M}(\mu)$ er $(\mathcal{C}, \cup f)$ -stabil.

Lad $M, N \in \mathcal{M}(\mu)$ og lad $A \subseteq \Omega$ være givet

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu(A \cap M) + \mu(A \setminus M) = \mu(A \setminus M^c) + \mu(A \cap M^c) \\ &= \mu(A \cap M^c) + \mu(A \setminus M^c)\end{aligned}$$

Dvs. $M^c \in \mathcal{M}(\mu)$ og dermed er $\mathcal{M}(\mu)$ $(\mathcal{C})$ -stabil

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu(A \cap M) + \mu(A \setminus M) = \mu(A \cap M) + \mu((A \cap M) \cap N) + \mu((A \cap M) \setminus N) \\ &= \mu((A \cap M \cap M) \cup (A \cap N \cap M)) + \mu((A \cap N) \setminus M) + \mu(A \setminus (M \cup N)) \\ &= \mu(((A \cap M) \cup (A \cap N)) \cap M) + \mu((A \cap (M \cup N)) \setminus M) + \mu(A \setminus (M \cup N)) \\ &= \mu(A \cap (M \cup N) \cap M) + \mu(A \cap (M \cup N) \setminus M) + \mu(A \setminus (M \cup N)) \\ &= \mu(A \cap (M \cup N)) + \mu(A \setminus (M \cup N))\end{aligned}$$

Dvs. $M \cup N \in \mathcal{M}(\mu)$ og dermed er $\mathcal{M}(\mu)$ $(\cup f)$ -stabil.

Vi har dermed vist, at $\mathcal{M}(\mu)$ er en algebra.

Lad $\{M_j\}_{j=1}^\infty \subseteq \mathcal{M}(\mu)$ betegne en følge af disjunkte mængder (Hilkerende $\mathcal{M}(\mu)$)

$$\text{Definer } M^n := \bigcup_{j=1}^n M_j \quad R_n := \bigcup_{j=n}^\infty M_j$$

Vi har lige vist, at $\mathcal{M}(\mu)$ er en algebra; dette medfører, at $M^{n-1} \in \mathcal{M}(\mu)$

Heraf får vi for et vilk. $A \subseteq \Omega$, at

$$\begin{aligned}\mu(A \cap M^n) &= \mu(A \cap M^n \cap M^{n-1}) + \mu((A \cap M^n) \setminus M^{n-1}) \\ &= \mu(A \cap M^{n-1}) + \mu(A \cap (M^n \setminus M^{n-1})) \\ &= \mu(A \cap M^{n-1}) + \mu(A \cap M_n)\end{aligned}$$

Ved successivt at anvende denne 'formel' for $n=1, 2, \dots, n$ fås

$$\mu(A \cap (\bigcup_{j=1}^\infty M_j)) = \mu(A \cap M^n) = \sum_{j=1}^n \mu(A \cap M_j) \quad (*)$$

Sæt $A = \Omega$ i $*$, da fås $\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(M_j)$, dvs. μ opfylder 1.1.3 da μ trivielt (jvf. antagelse) opfylder 1.1.2, har vi dermed, at μ er et indhold på $\mathcal{M}(\mu)$.

Lad $A \subseteq \Omega$ være givet (husk $M^{n-1} \in \mathcal{M}(\mu)$)

$$\begin{aligned} \mu(A \cap R_1) &= \mu(A \cap R_1 \cap M^{n-1}) + \mu((A \cap R_1) \setminus M^{n-1}) \\ &= \mu(A \cap M^{n-1}) + \mu(A \cap (R_1 \setminus M^{n-1})) \\ &= \mu(A \cap M^{n-1}) + \mu(A \cap R_n) \\ &= \mu(A \cap (\bigcup_{j=1}^{n-1} M_j)) + \mu(A \cap (\bigcup_{j=n}^{\infty} M_j)) \underset{(*)}{=} \sum_{j=1}^{n-1} \mu(A \cap M_j) + \mu(A \cap (\bigcup_{j=n}^{\infty} M_j)) \end{aligned}$$

Af ovenstående, og da $R_{n+1} \subseteq R_n$; $R_n \setminus R_{n+1} = M_n \in \mathcal{M}(\mu)$ ifølge hjælpesætn. giver, at $\forall n \in \mathbb{N}$: $\mu(A \cap R_n) \geq \mu(A \cap R_{n+1})$, fås jvf. regnearbejde/sætn. om konvergens af positive følger, at

$$\mu(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)) = \mu(A \cap R_1) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A \cap M_j) + \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap (\bigcup_{j=n}^{\infty} M_j)) \quad (+)$$

Antag, at μ er σ -subadditiv på 2^{Ω} .

Lad $\{M_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{M}(\mu)$ betegne en disjunkt følge af mængder.

Lad $A \subseteq \Omega$.

Af (+) følger, at $\mu(A \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap M_n)$

Da μ er σ -subadditiv på 2^{Ω} har desuden: $\mu(A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap M_n)$ heraf følger, at $\mu(A \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap M_n)$. (@)

Sæt $A = \Omega$ i (@), da fås $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(M_n)$, dvs. μ opfylder 1.1.5, da μ trivielt opfylder (jvf. antagelse) 1.1.4, har vi dermed, at μ er et mål på $\mathcal{M}(\mu)$, (under antagelse, at μ σ -subadditiv) hvis $\mathcal{M}(\mu)$ er en σ -algebra.

Husk $M^n \in \mathcal{M}(\mu)$, dvs.

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu(A \cap M^n) + \mu(A \setminus M^n) \\ &= \mu(A \cap (\bigcup_{j=1}^n M_j)) + \mu(A \setminus M^n)\end{aligned}$$

$$\stackrel{(*)}{=} \sum_{j=1}^n \mu(A \cap M_j) + \mu(A \setminus M^n)$$

$$\geq \sum_{j=1}^n \mu(A \cap M_j) + \mu(A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)$$

μ σ -subadditiv på 2^{Ω}
 $(A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n) \subseteq (A \setminus M^n)$

Ved at lade $n \rightarrow \infty$ i ovenstående og med brug af (*) fås

$$\mu(A) \geq \mu(A \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)) + \mu(A \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n))$$

Da $A = (A \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)) \cup (A \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n))$ følger, da μ er σ -subadditiv på 2^{Ω} , at

$$\mu(A) \leq \mu(A \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)) + \mu(A \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n))$$

Alt i alt, at

$$\mu(A) = \mu(A \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n)) + \mu(A \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n))$$

Da $A \in \mathcal{A}$ var vilkårlig, ser vi, at $\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n \in \mathcal{M}(\mu)$

Herved har vi vist, at $\mathcal{M}(\mu)$ er (Σ_c) -stabil. Tidligere har vi vi vist at $\mathcal{M}(\mu)$ er en algebra (under sædvanlige antagelser), derfor følger af 1.2.9 og 1.2.6, at $\mathcal{M}(\mu)$ er (C, U_c) -stabil. Dvs. $\mathcal{M}(\mu)$ er en σ -algebra. (under antagelse at μ σ -subadditiv på 2^{Ω})

□

Additivitet af indre og ydre mål (1.24)

$$\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq 2^{\Omega} \quad (\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H} \neq \emptyset), \quad \emptyset \in \mathcal{F}, \quad \mu: \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ \quad (\mu(\emptyset) = 0)$$

Der gælder følgende:

$$\mu_* \text{ superadditiv på } 2^{\Omega} \text{ og } \forall F \in \mathcal{F}: \mu_*(F) \geq \mu(F) \quad (1)$$

$$\mu \text{ superadditiv på } \mathcal{F} \iff \mu_* \text{ udvider } \mu \quad (2)$$

$$\mu^* \sigma\text{-subadditiv på } 2^{\Omega} \text{ og } \forall F \in \mathcal{F}: \mu^*(F) \leq \mu(F) \quad (3)$$

$$\mu \sigma\text{-subadditiv på } \mathcal{F} \iff \mu^* \text{ udvider } \mu \quad (4)$$

$$\begin{aligned} &\text{Hvis } \mu \text{ superadditiv på } \mathcal{F} \text{ og } \mathcal{F} \text{ } (\Sigma\mathcal{F})\text{-stabil:} \\ &\forall A \subseteq \Omega: \mu_*(A) = \sup \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, F \subseteq A \} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} &\text{Hvis } \mu \sigma\text{-subadditiv på } \mathcal{F} \text{ og } \mathcal{F} \text{ } (U\mathcal{C})\text{-stabil:} \\ &\forall A \subseteq \Omega: \mu^*(A) = \inf \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, F \supseteq A \} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} &\text{Hvis } \mathcal{G} \text{ approximerer } \mu \text{ på } \mathcal{F} \text{ og } \bigcup_{i=1}^n G_i, G_1, \dots, G_n \text{ disjunkte} \in \mathcal{H}: \\ &\mathcal{H} \text{ approximerer } \mu_* \text{ på } 2^{\Omega} \end{aligned} \quad (7)$$

Beweis:

(1)

Af def. på μ_* følger, at...

$$\forall F \in \mathcal{F} : \mu_*(F) \geq \mu(F)$$

μ_* er voksende på $2^{\mathcal{X}}$

$$\mu_*(\emptyset) = 0 \quad (\text{da } \mu(\emptyset) = 0 \text{ + alle delmængder af } \emptyset \text{ er } \emptyset) \text{ - dvs. } \mu_* \text{ m\u00f8dfuldt.}$$

Vi skal nu vise, at μ_* er superadditiv, dvs.:

$$\forall A_1, \dots, A_n \text{ disjunkte } \subseteq \mathcal{R}, \bigcup_{i=1}^n A_i \subseteq A \subseteq \mathcal{R} : \mu_*(A) \geq \sum_{i=1}^n \mu_*(A_i) \quad (*)$$

Lad $A_1, \dots, A_n$ disjunkte og $A \subseteq \mathcal{R} : \bigcup_{i=1}^n A_i \subseteq A$ v\u00e6re givet.

Der er to muligheder:

$\mu_*(A) = \infty$, da er (*) trivielt opfyldt

$$\mu(A) < \infty :$$

Vi kan vise (*) ved at vise: $\forall \varepsilon > 0 : \mu_*(A) + \varepsilon \geq \sum_{i=1}^n \mu_*(A_i)$

(At $\forall \varepsilon > 0 : A + \varepsilon \geq B \Rightarrow A \geq B$ vises nemt ved et modstridelsesbevis)

Lad $\varepsilon > 0$ v\u00e6re givet:

Da μ_* er voksende p\u00e5 $2^{\mathcal{X}}$ og da $\bigcup_{i=1}^n A_i \subseteq A \Rightarrow A_i \subseteq A, i=1, \dots, n$ g\u00e5lder

$\mu_*(A_i) \leq \mu_*(A) < \infty, i=1, \dots, n$. Af def. p\u00e5 supremum og μ_* f\u00f8lger da

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \exists F_j, j=1, \dots, k(i) \text{ disjunkte } \in \mathcal{F} : \bigcup_{j=1}^{k(i)} F_j \subseteq A_i \wedge \mu_*(A_i) \leq \varepsilon 2^{-i} + \sum_{j=1}^{k(i)} \mu(F_j) \quad (+)$$

$A_1, \dots, A_n$ disjunkte medf\u00f8rer, at $F_{j(i)}, j=1, \dots, k(i), i=1, \dots, n$ disjunkte $\in \mathcal{F}$

Desuden g\u00e5lder $\bigcup_{i,j} F_{j(i)} \subseteq \bigcup_i A_i \subseteq A$, da μ_* er voksende og j\u00e5f. def.

p\u00e5 μ_* f\u00e5s

$$\sum_{i=1}^n \mu_*(A_i) \leq \varepsilon \sum_{i=1}^n 2^{-i} + \sum_{i,j} \underbrace{\mu(F_{j(i)})}_{\substack{\mu_* \text{ voksende} \\ + \text{ def.}}} \leq \varepsilon + \mu_*(A)$$

(2) ' $\Rightarrow$ ':

Lad $F \in \mathcal{F}$, antag $F_1, \dots, F_n$ disjunkte $\in \mathcal{F} : \bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq F$

Da μ er superadditiv på $\mathcal{F}$ gælder $\sum_{i=1}^n \mu(F_i) \leq \mu(F)$, af def. på μ_* (og def. på sup.) følger, at $\mu_*(F) \leq \mu(F)$, definitionen giver også (idet $F \in \mathcal{F}, F \subseteq F$) at $\mu(F) \leq \mu_*(F)$, dvs. $\mu(F) = \mu_*(F)$

Vi kan konkludere, at $\forall F \in \mathcal{F} : \mu_*(F) = \mu(F)$ men det vil jo sige, at μ_* udvider μ .

' $\Leftarrow$ ':

Af (1) følger at $\forall F \in \mathcal{F}, F_1, \dots, F_n$ disjunkte $\in \mathcal{F} : \bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq F : \mu_*(\bigcup_{i=1}^n F_i) \leq \mu_*(F)$, da μ_* er superadditiv på $\mathbb{R}^{\mathcal{F}}$ og dermed specielt på $\mathcal{F}$, da vi af antagelsen om, at μ_* udvider μ har $\forall F \in \mathcal{F} : \mu_*(F) = \mu(F)$ gælder specielt, at $\mu(\bigcup_{i=1}^n F_i) \leq \mu(F)$

(3), (4) vises tilsvarende

(5)

Lad $A \in \Sigma$ (Vi benytter den 'endelige' udgave af def. på μ_*)

$F_1, \dots, F_n$ disjunkte $\in \mathcal{F}$: $\bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq A$

Da $\mathcal{F}$ er (Σf) -stabil gælder at $\bigcup_{i=1}^n F_i := F_0 \in \mathcal{F}$

Da μ er superadditiv (og da $F_0 \in \mathcal{F}$, $F_0 = \bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq A$) gælder

$$\sum_{i=1}^n \mu(F_i) \leq \mu(F_0) \leq \sup \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, F \subseteq A \} \quad (*)$$

Af def. på μ_* følger, at $\mu_*(A) \leq \sup \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, F \subseteq A \}$ (pr. $(*)$)

samt, at $\mu_*(A) \geq \sup \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, F \subseteq A \}$, dvs.

$$\mu_*(A) = \sup \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, F \subseteq A \}.$$

(6) vises tilsvarende (For μ^* gælder kun en 'uendelig' udgave af definitionen)

(7)

Vi skal vise, at $\forall A \in \mathcal{Z}^{\mathcal{R}} : \mu_*(A) \leq \sup \{ \mu_*(H) \mid H \in \mathcal{H}, H \subseteq A \}$

Lad $A \in \mathcal{R}$

Vælg $a \in \mathbb{R}_+ : a < \mu_*(A)$ (*)

Af def. på μ_* følger $\exists F_1, \dots, F_n$ disjunkte $\in \mathcal{F} : a < \sum_{i=1}^n \mu(F_i)$ og $\bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq A$

$\mathcal{G}$ approximerer μ på $\mathcal{F}$, dvs. $\forall F \in \mathcal{F} : \mu(F) \leq \sup \{ \mu_*(G) \mid G \in \mathcal{G}, G \subseteq F \}$

Specielt har vi, at (jvf. def./egenskaber ved supremum) $\exists G_1, \dots, G_n \in \mathcal{G} : G_i \subseteq F_i, \dots, G_n \subseteq F_n$
(da de i (*) gælder skarp ulighed)
og $a < \sum_{i=1}^n \mu_*(G_i)$. $G_1, \dots, G_n$ er disjunkte (da $F_1, \dots, F_n$ disjunkte).

$H_0 := \bigcup_{i=1}^n G_i \in \mathcal{H}$ (da G -ene disjunkte + antagelse)

Sæt $c := \sup \{ \mu_*(H) \mid H \in \mathcal{H}, H \subseteq A \}$; $H_0 := \bigcup_{i=1}^n G_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq A$, dvs. $\mu_*(H_0) \leq c$

Alt i alt har vi (husk (1): μ_* superadditiv på $\mathcal{Z}^{\mathcal{R}}$)

$$a < \mu_*(A) \quad \wedge \quad a < \sum_{i=1}^n \mu_*(G_i) \leq \mu_*(H_0) \leq c$$

$\uparrow$
superadditivitet

$\Downarrow$ (entydighed af grænseovergang)

$$\mu_*(A) \leq c = \sup \{ \mu_*(H) \mid H \in \mathcal{H}, H \subseteq A \}; \quad (\text{ved at se på overgangen } a \uparrow \mu_*(A))$$

□

Tæthed (1.25)

$$\mathcal{F} \subseteq 2^X \quad (\mathcal{F} \neq \emptyset, \emptyset \in \mathcal{F}) \quad \mu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad (\mu(\emptyset) = 0)$$

Af def. på μ_* , μ^* følger, at disse er veldefinerede mængdefunktioner på hele 2^X .

Carathéodory's sætn. giver, at μ_* er et indhold på $\mathcal{M}(\mu_*)$, samt at (da μ^* er σ -subadditiv) μ^* er et mål på $\mathcal{M}(\mu^*)$.

(Indforstået - jvf. def. på indhold/mål - at $\mathcal{M}(\mu_*)$ algebra, $\mathcal{M}(\mu^*)$ σ -algebra)

For at løse 'udvidelsesproblemet' (Hvornår/hvordan kan vi udvide μ til et indhold / et mål) er det interessant at vide (jvf. ovenstående resultat) hvornår $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*)$ / $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$

Med passende definitioner kan vi bevise nogle kraftfulde sætninger:

μ er indre tæt: $\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F} : \mu(F_1) = \mu_*(F_1 \cap F_2) + \mu_*(F_1 \setminus F_2)$

μ er ydre tæt: $\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F} : \mu(F_1) = \mu^*(F_1 \cap F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2)$

Kriterier for indre og ydre tæthed (1.26)

$$\mathcal{F} \subseteq 2^X \ (\mathcal{F} \neq \emptyset, \emptyset \in \mathcal{F}) \quad \mu: \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ \quad (\mu(\emptyset) = 0)$$

Da gælder:

$$\mu \text{ er indre tæt} \iff \mu_* \text{ udvider } \mu \text{ og } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*) \quad (1)$$

$$\mu \text{ er ydre tæt} \iff \mu^* \text{ udvider } \mu \text{ og } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*) \quad (2)$$

Hvis μ er superadditiv på $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ er $(\cap\mathcal{F})$ -stabil, således at ... (3)

$$\forall F, F' \in \mathcal{F}, F' \supseteq F \exists F_1, F_2, \dots \text{ disjunkte } \in \mathcal{F} : F' \setminus F \supseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \wedge \mu(F') \leq \mu(F) + \sum_{j=1}^{\infty} \mu(F_j)$$

Da er μ indre tæt; specielt er ethvert indhold på en algebra indre tæt.

Hvis μ er σ -subadditiv på $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ er $(\cap\mathcal{F})$ -stabil, således at ... (4)

$$\forall F, F' \in \mathcal{F}, F' \supseteq F \exists F_1, F_2, \dots \in \mathcal{F} : F' \setminus F \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \wedge \mu(F') \geq \mu(F) + \sum_{j=1}^{\infty} \mu(F_j)$$

Da er μ ydre tæt; specielt er ethvert σ -subadditivt indhold på en algebra ydre tæt.

Bevis:

(1) $\implies$:

$$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F} : \mu(F_1) = \mu_*(F_1 \cap F_2) + \mu_*(F_1 \setminus F_2)$$

Lad $F \in \mathcal{F}$ være givet. Sæt $F_1 = F$ og $F_2 = \emptyset$ i ovenstående, da har vi, at $\mu(F) = \mu_*(F)$, dvs. μ_* udvider μ

Lad $F \in \mathcal{F}$; og lad $A \subseteq \Omega$ være givet

$$F_1, \dots, F_n \text{ disjunkte } \in \mathcal{F} : \bigcup_{i=1}^n F_i \subseteq A$$

$$\sum_{i=1}^n \mu(F_i) = \sum_{i=1}^n (\mu_*(F_i \cap F) + \mu_*(F_i \setminus F)) \leq \underbrace{\mu_*(A \cap F) + \mu_*(A \setminus F)}_{\substack{\mu_* \text{ superadditiv} \\ (1.24)}} \leq \mu_*(A)$$

$\uparrow$ μ indre tæt

Af def. på μ_* følger, at $(\sup \text{ af alle } \sum_{i=1}^n \mu(F_i) \text{-'ene}) \quad \mu_*(A) = \mu_*(A \cap F) + \mu_*(A \setminus F)$

Dette gælder $\forall A \subseteq \Omega$, dvs. (jvf. def. på $\mathcal{M}(\mu_*)$) at $F \in \mathcal{M}(\mu_*)$. F. vilk. $\implies \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*)$

1. $\Leftarrow$;

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*) , \forall F \in \mathcal{F} : \mu(F) = \mu_*(F) \quad (*)$$

$$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F} : \mu(F_1) \stackrel{(*)}{=} \mu_*(F_1) = \mu_*(F_1 \cap F_2) + \mu_*(F_1 \setminus F_2), \text{ dvs. } \mu \text{ indre t t.}$$

$\uparrow$
 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*)$

(2) vises tilsvarende.

(3)

Lad $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ v re givet

Definer $F := F_1 \cap F_2$, $F' := F_1$, $F \subseteq F'$

Da $\mathcal{F}$ er $(\cap)$ -stabil g lder $F, F' \in \mathcal{F}$, iflg. antagelse $\exists F'_1, F'_2, \dots$ disjunkte $\in \mathcal{F}$:
 $\bigcup_{i=1}^{\infty} F'_i \subseteq F' \setminus F$ og $(+)$

$$\mu(F_1) = \mu(F') \stackrel{(+)}{\leq} \mu(F) + \sum_{i=1}^{\infty} \mu(F'_i) \stackrel{\substack{\mu \text{ superadditiv} \\ \Rightarrow \mu_* \text{ udvider } \mu}}{=} \mu_*(F) + \sum_{i=1}^{\infty} \mu_*(F'_i)$$

$$\stackrel{\substack{\mu_* \text{ superadditiv} \\ \downarrow}}{\leq} \mu_*(F) + \mu_*(F' \setminus F) = \mu_*(F_1 \cap F_2) + \mu_*(F_1 \setminus F_2) \\ \stackrel{\substack{\mu_* \text{ udvider } \mu \\ (\text{da } \mu \text{ superadditiv})}}{\leq} \mu_*(F_1) \stackrel{(*)}{=} \mu(F_1)$$

$\Downarrow$

$$\mu(F_1) = \mu_*(F_1 \cap F_2) + \mu_*(F_1 \setminus F_2), \text{ dvs. } \mu \text{ er indre t t.}$$

(specielt jf. 1.3 $\Leftrightarrow \mu$ indre t t, hvis μ er et indl dt p r en algebra $\mathcal{F}$)

(4) vises tilsvarende.

Udvidelsessætningen (1.27)

$$\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega} \quad (\mathcal{F} \neq \emptyset, \emptyset \in \mathcal{F}) \quad \mu: \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ \quad (\mu(\emptyset) = 0)$$

Der gælder:

Hvis μ er ydre tæt, da eksisterer et mål, μ_0 på $\sigma(\mathcal{F})$ således, at μ_0 er en udvidelse af μ . (1)

Hvis μ er indre tæt, da eksisterer et indhold, μ_1 på $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ således, at μ_1 er en udvidelse af μ . (2)

Hvis μ er indre tæt og μ^* er σ -subadditiv på $\mathcal{A}(\mathcal{F})$, da eksisterer et mål, μ_2 på $\sigma(\mathcal{F})$ således, at μ_2 udvider μ . (3)

Bevis:

(1)

Vi har, at μ^* er σ -subadditiv (additivitet af indre og ydre mål).

Af Carathéodorys sætn. følger, at μ^* er et mål på $\mathcal{M}(\mu^*)$

(indførstæet: $\mathcal{M}(\mu^*)$ er σ -algebra, hvilket også er en konsekvens af Carathéodory)

Desuden følger af 1.26, at μ^* udvider μ og $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$, da μ er ydre tæt. (1.26: 'kriterier for indre og ydre tæthed')

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*), \mathcal{M}(\mu^*) \text{ } \sigma\text{-algebra} \xRightarrow{1.5.3} \sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$$

$$\text{Definer } \mu_0: \sigma(\mathcal{F}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \forall F \in \sigma(\mathcal{F}): \mu_0(F) := \mu^*(F)$$

Da μ^* er et mål på $\mathcal{M}(\mu^*)$ og $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$ følger af def. på μ_0 og def. på mål (1.1.4-1.1.5) at μ_0 er et mål på $\sigma(\mathcal{F})$.

Af def. af μ_0 som restriktionen af μ^* til $\sigma(\mathcal{F})$ er det klart at μ_0 udvider μ (da μ^* jvf. ovenstående brug af 1.26 udvider μ).

- (2) Af Carathéodory's sætn. følger, at $\mathcal{M}(\mu_*)$ er en algebra, samt at μ_* er et indhold på $\mathcal{M}(\mu_*)$.
 Da, μ er indre tæt, følger af 'kriterier for indre og ydre tæthed', at μ_* udvider μ (*) og $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*)$

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu_*) , \mathcal{M}(\mu_*) \text{ algebra} \xRightarrow{1.5.2} \alpha(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mu_*)$$

Definer $\mu_1: \alpha(\mathcal{F}) \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+ \quad \forall \mathcal{F} \in \alpha(\mathcal{F}) : \mu_1(\mathcal{F}) := \mu_*(\mathcal{F})$

Da μ_* er et indhold på $\mathcal{M}(\mu_*)$ og $\alpha(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mu_*)$ følger af def. på μ_1 og def. på indhold (1.1.2-3) at μ_1 er et indhold på $\alpha(\mathcal{F})$.

Af def. af μ_1 som restriktionen af μ_* til $\alpha(\mathcal{F})$, samt (*), er det klart, at μ_1 udvider μ

- (3) Vi har brug for en lille 'hj.sætn.': $\sigma(\mathcal{F}) = \sigma(\alpha(\mathcal{F}))$
 '⊆': Da $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\alpha(\mathcal{F}))$ (jvf. 1.5.2+3) følger af 1.5.3, at $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\alpha(\mathcal{F}))$
 '⊇': Af konstruktionen af $\alpha(\mathcal{F})$ givet ved 1.16.1 og da $\sigma(\mathcal{F})$ er (G,uc)-stat følger, at $\alpha(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$ af 1.5.3 følger $\sigma(\alpha(\mathcal{F})) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$ ◻

Af antagelsen om, at μ er indre tæt, følger af (2), at μ_1 -defineret som restriktionen af μ_* til $\alpha(\mathcal{F})$ -udvider μ , og at μ_1 er et indhold på $\alpha(\mathcal{F})$.

Vi antager, at μ_* er σ -subadditiv på $\alpha(\mathcal{F})$, dvs. μ_1 (def. af μ_1) er σ -subadditiv på $\alpha(\mathcal{F})$.

μ_1 er altså et σ -subadditivt indhold på $\alpha(\mathcal{F})$ - af sætn. om 'kriterier for indre og ydre tæthed' (1.26) følger, at μ_1 er ydre tæt. Da giver (1), at der eksisterer et mål μ_2 på $\sigma(\alpha(\mathcal{F})) = \sigma(\mathcal{F})$, således at μ_2 udvider μ_1 . ($\mu_2 = \mu_1^*$ (restriktionen af μ_1^* til $\sigma(\mathcal{F})$))

Bm, til 'Udvidelsessætningen':

Antag $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$ ($\mathcal{F} \neq \emptyset, \emptyset \in \mathcal{F}$), $\mathcal{F}$ (nf)-stabil, $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$ ($\mu(\emptyset) = 0$) og

$$\exists F_1, F_2, \dots \in \mathcal{F} : \mu(F_1), \mu(F_2), \dots < \infty \quad \wedge \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i = \Omega$$

Af 'entydighedsætningen for mål' (1.7) følger (sæt $\mathcal{G} = \mathcal{F}$ og $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F})$), at der er ét mål på $\sigma(\mathcal{F})$, der udvider μ .

Fuldstændiggørelsen af mål (1.28)

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ betegner et målrum

Dvs. μ er et mål på σ -algebraen $\mathcal{F}$ ($\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$)

Specielt er μ σ -subadditiv (jvf. 1.3 + 1.4), af 'Additivitet af indre og ydre mål' følger, at $\forall A \subseteq \Omega: \mu^*(A) = \inf \{ \mu(F) \mid F \in \mathcal{F}, A \subseteq F \}$

Sætn. 'Kriterier for indre og ydre mål' giver, at μ er ydre tæst, og dermed at μ^* udvider μ og $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$

Carathéodory's sætn. giver, at (da μ^* er σ -subadditiv) at $\mathcal{M}(\mu^*)$ er en σ -algebra, og at μ^* er et mål på $\mathcal{M}(\mu^*)$.

Definer:

$$\mathcal{M}(\mu) := \mathcal{M}(\mu^*) \quad , \quad \bar{\mu}: \mathcal{M}(\mu^*) \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad \forall M \in \mathcal{M}(\mu^*): \bar{\mu}(M) := \mu^*(M)$$

Vi har lige argumenteret for, at $\mathcal{M}(\mu)$ er en σ -algebra (på Ω), samt at $\bar{\mu}$ er et mål på $\mathcal{M}(\mu)$. ($\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu)$, $\bar{\mu}$ udvider μ)

$\mathcal{M}(\mu)$ kaldes fuldstændiggørelsen af $\mathcal{F}$ under μ .

$\bar{\mu}$ kaldes fuldstændiggørelsen af μ .

$A \subseteq \Omega$ siges at være μ -målbar, hvis $A \in \mathcal{M}(\mu)$

Hvis $\mathcal{F} = \mathcal{M}(\mu)$ siges μ at være fuldstændigt.

Se desuden Exc. 1.38 - bl.a. for en behandling af $\mathcal{L}(\mu)$.

$$(\mathcal{L}(\mu) := \{ A \subseteq \Omega \mid \exists F_0, F_1 \in \mathcal{F}: F_0 \subseteq A \subseteq F_1, \wedge \mu(F_1 \setminus F_0) = 0 \})$$

Lebesgue-Stieltjes mål på $\mathbb{R}$ (1.32)

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow F(x) \leq F(y)$$

$$\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, x \in \mathbb{R}: x_n \downarrow x \Rightarrow F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$$

$$\mathcal{F} := \{[a, b] \mid a \leq b\}, \quad \mu([a, b]) := F(b) - F(a) \quad ([a, b] \in \mathcal{F})$$

Påstand: Der eksisterer et entydigt bestemt mål på $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, λ_F , som opfylder

$$\forall a \leq b \in \mathbb{R}: \lambda_F([a, b]) = F(b) - F(a)$$

(λ_F betegnes Lebesgue-Stieltjes målet induceret af F)

Hjælpesætninger:

Påstand: μ er subadditiv på $\mathcal{F}$

Bevis:

Tjek først at μ er en mængdefkt.: Sæt $a=b$ i $[a, b]$, da ser vi, at $\emptyset \in \mathcal{F}$, og det er klart, at $\mu(\emptyset) = 0$. (Da $a=b \Rightarrow F(b) = F(a)$)

$$\text{Vi skal vise, at } \forall F, \{F_k\}_{k=1}^n \in \mathcal{F}: F \subseteq \bigcup_{k=1}^n F_k \Rightarrow \mu(F) \leq \sum_{k=1}^n \mu(F_k)$$

$$\text{Da } \forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow F(x) \leq F(y) \text{ gælder } \forall H \in \mathcal{F}: \mu(H) \geq 0 \quad (*)$$

Det betyder, at kan vi vise påstanden for et udvalgt $G_1, \dots, G_m$ ($m \leq n$)


af $F_1, F_2, \dots, F_n$ er vi færdige, da vi i sådant et tilfælde har

$$\text{følgende vurdering: } \mu(F) \leq \sum_{j=1}^m \mu(G_j) \leq \sum_{k=1}^n \mu(F_k)$$

$\uparrow$
 $\mu(F_k) \geq 0$

Vi vælger $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ således at $G_j = (a_j, b_j]$ $j=1, \dots, m$

Vælg G -erne således, at $F \subseteq \bigcup_{j=1}^m G_j$ og således, at de opfylder



Beweis for $\mu(F) \leq \sum_{j=1}^m \mu(G_j)$ ved induktion på m :

$$m=1: F \subseteq G_1 \Rightarrow \mu(F) = F(b) - F(a) \leq F(b_1) - F(a_1) = \mu(G_1) \quad \text{o.k.}$$

F voksende $\Rightarrow F(b_1) \geq F(b)$ og $F(a) \geq F(a_1)$

$$m=2: F \subseteq G_1 \cup G_2$$

$$\begin{aligned} \mu(F) &= F(b) - F(a) \leq F(b_2) - F(a_1) \leq F(b_2) - F(a_1) + (F(b_1) - F(a_2)) \\ &= F(b_1) - F(a_1) + F(b_2) - F(a_2) = \mu(G_1) + \mu(G_2) \quad \text{o.k.} \end{aligned}$$

Antag påstanden sand for $m-1$:

Sæt $H := \bigcup_{j=1}^{m-1} G_j$. Vi har dermed, at $F \subseteq H \cup G_m$ af ovenstående udregning.

$$\text{fås, at } \mu(F) \leq \mu(H) + \mu(G_m) \leq \sum_{j=1}^{m-1} \mu(G_j) + \mu(G_m) = \sum_{j=1}^m \mu(G_j)$$

$\uparrow$
induktionsantagelsen

□

Påstand: μ er σ -subadditiv på $\mathcal{F}$

Beweis:

$$\text{Vi skal vise: } \forall F, \{F_n\}_{n=1}^\infty \in \mathcal{F} : F \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty F_n \Rightarrow \mu(F) \leq \sum_{n=1}^\infty \mu(F_n)$$

Da F er højrekont.: $\forall \varepsilon > 0, n \geq 1 \exists \delta_n > 0 : 0 \leq F(b_n + 2\delta_n) - F(b_n) \leq \varepsilon/2^n$,
 $\uparrow$
 F voksende

$a, b, a_n, b_n \in \mathbb{R} : a \leq b, a_n \leq b_n : F = (a, b], F_n = (a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$

$F \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty F_n$ der med ovenstående notation er ækvivalent med

$$(a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty (a_n, b_n]$$

Antag $F = \emptyset$, da er påstanden trivial idet $\mu(\emptyset) = 0$ og μ er ikke-negativ. (jvf. bm. på forrige side)

Antag $F \neq \emptyset$ med notationen indført på den foregående side betyder dette, at $a < b \implies \exists \psi > 0 \forall \varepsilon > 0: \exists \varepsilon' < \psi: [a + \varepsilon, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n)$

Vi viser, nu at $[a + \varepsilon, b]$ er kompakt, dvs. $\exists n \in \mathbb{N}: [a + \varepsilon, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i + \delta_i)$

Bevis ved modstid:

Antag $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i + \delta_i)$ (husk $[a + \varepsilon, b] \neq \emptyset$)

Da en foreningsmængde af åbne intervaller er en åben mængde i $\mathbb{R}$ ^(*)

følger, at $[a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i + \delta_i)$ er lukket mængde i $\mathbb{R}$ ^(@) (luk + åben = luk)

Da $\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i + \delta_i) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n+1} (a_i, b_i + \delta_i)$ ser vi desuden, at

$$[a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i + \delta_i) \supseteq [a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{i=1}^{n+1} (a_i, b_i + \delta_i)$$

Dvs. $\{[a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i + \delta_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$ er en aftagende følge af lukkede delmængder af $\mathbb{R}$, hvor intet 'led' ifølge antagelsen er den tomme mængde. Sæt $L = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{[a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i + \delta_i)\}$. Da enhver fællesmængdedannelse af lukkede mængder er lukket, er L lukket. Af antagelsen følger dermed, at $L \neq \emptyset$, (L er jo mere præcist en foreningsmængde af lukkede intervaller)

Vi ser, at $L = [a + \varepsilon, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n) \neq \emptyset$ men det er jo i modstid med at $[a + \varepsilon, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n)$, dvs.

$$\exists n \in \mathbb{N}: [a + \varepsilon, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i + \delta_i)$$

(*)

Vi arbejder her i $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

(@)

mere præcist er mængden en forening af lukkede intervaller.

Den netop beviste påstand medfører, at (med vores valg af ε)

$$(a+2\varepsilon, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i+2\delta_i]$$

Da μ er subadditiv på $\mathcal{F}$ følger, at

$$\begin{aligned} \mu((a+2\varepsilon, b]) &\leq \sum_{i=1}^n \mu((a_i, b_i+2\delta_i]) = \sum_{i=1}^n F(b_i+2\delta_i) - F(a_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^n F(b_i) - F(a_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{med vores valg af } \delta_i \end{aligned}$$

$\Downarrow$ (husk $\forall n \in \mathbb{N} : \mu(F_n) = F(b_n) - F(a_n) \geq 0$)

$$F(b) - F(a+2\varepsilon) \leq \sum_{i=1}^n (F(b_i) - F(a_i)) + \varepsilon \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} \leq \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) + \varepsilon \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i}}_{=1}$$

$\Downarrow \varepsilon > 0$ og egenskaben ved F (F højrekontinuerlig)

$$F(b) - F(a) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) \implies \mu(F) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \quad \square$$


Påstand: μ er ydre tæt

Bevis:

Vi skal vise, at $\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F} : \mu(F_1) = \mu^*(F_1 \cap F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2)$

Da μ er σ -subadditiv på $\mathcal{F}$ følger af sætn. 'Additivitet af indre og ydre mål' (1.24.4), at μ^* udvider μ .

Der er 3 situationer, som er væsentlig forskellige.



1)

$$F_1 \cap F_2 = \emptyset \in \mathcal{F} \text{ (at } \emptyset \in \mathcal{F} \text{ har vi tidligere vist)}$$

$$F_1 \setminus F_2 = F_1 \in \mathcal{F} \text{ (pr. antagelse)}$$

$$\mu(F_1) = \mu(\emptyset) + \mu(F_1) = \mu(F_1 \cap F_2) + \mu(F_1 \setminus F_2) = \mu(F_1 \cap F_2) + \mu(F_1 \setminus F_2)$$

$\mu(\emptyset) = 0$ $\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}}$

2)

$$F_1 \cap F_2 = F_2 \in \mathcal{F} \text{ (pr. antagelse)}$$

$$F_1 \setminus F_2 = (a, c] \cup (d, b]$$

$$\begin{aligned} \mu(F_1) &:= F(b) - F(a) = F(b) - F(d) + F(d) - F(c) + F(c) - F(a) \\ &= (F(d) - F(c)) + \{(F(c) - F(a)) + (F(b) - F(d))\} \\ &= \mu(F_2) + \{(F(c) - F(a)) + (F(b) - F(d))\} \end{aligned}$$

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}} = \mu^*(F_2) + \mu^*((a, c]) + \mu^*((d, b])$$

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}} = \mu^*(F_2) + \mu^*((a, c]) + \mu^*((d, b])$$

$$\geq \mu^*(F_2) + \mu^*((a, c] \cup (d, b])$$

μ^* subadditiv
(1.24.3)

$$= \mu^*(F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2) = \mu^*(F_1 \cap F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2)$$

$$\mu(F_1) = \mu^*(F_1) \leq \mu^*(F_1 \cap F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2)$$

$\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}}$ μ^* subadditiv
(1.24.3)

$$\text{Dus. } \mu(F_1) = \mu^*(F_1 \cap F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2)$$

3)

$$F_1 \cap F_2 = (c, b] \in \mathcal{F}$$

$$F_1 \setminus F_2 = (a, c] \in \mathcal{F}$$

$$\begin{aligned} \mu(F_1) &:= F(b) - F(a) = (F(b) - F(c)) + (F(c) - F(a)) \\ &= \mu((c, b]) + \mu((a, c]) = \mu(F_1 \cap F_2) + \mu(F_1 \setminus F_2) \end{aligned}$$

$$\stackrel{\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}}}{=} \mu^*(F_1 \cap F_2) + \mu^*(F_1 \setminus F_2)$$

□

Bm. beviset ovenfor viser desuden, at $\mathcal{F}$ er (μ^*) -stabil.

Bevis for 'hovedsætn.':

Da μ^* er σ -subadditiv, juf. sætn. om 'Additivitet af indre og ydre mål' (1.24.3) følger af Carathéodory's sætn. (1.23), at $\mathcal{M}(\mu^*)$ er en σ -algebra og μ^* er et mål på $\mathcal{M}(\mu^*)$ (arg. set i 1.28)

μ er ydre tæt af sætn. om 'kriterier for indre og ydre tæthed' (1.26) følger derfor, at μ^* udvider μ og $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$

Af 1.5.3 (+1.5.1) følger da $\mathcal{M}(\mu^*)$ er σ -algebra og $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$, at $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$

Juf. 1.10 gælder, at $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, dvs. $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$, samtidig har vi, at μ^* er et mål på $\mathcal{M}(\mu^*)$, dermed har vi, at $\lambda_{\mathbb{R}} = \mu^*|_{\mathcal{B}(\mathbb{R})}$ er et mål på $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ som udvider μ . (da μ^* udvider μ og $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$)

Antag, at $\tilde{\lambda}_{\mathbb{R}}$ er et andet mål på $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ som udvider μ .

$\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}$ er (nf) -stabil brolegn. på $\mathbb{R}$

Da $\tilde{\lambda}_F, \lambda_F$ begge udvider μ og dermed stemmer
overens på $\mathcal{F}$, gælder:

Definer $F_k = (-k, k]$, $k \geq 1$

Vi ser $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \mathbb{R}$ og $\forall F \in \mathcal{F}, k \geq 1: \lambda_F(F \cap F_k) = \tilde{\lambda}_F(F \cap F_k)$

samt, at $\forall k \geq 1: F_k \in \mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ og $\lambda_F(F_k) = \tilde{\lambda}_F(F_k) = F(k) - F(-\infty) =$

Af entydighedssætn. for (endelige) mål følger at $\tilde{\lambda}_F = \lambda_F$ $\square$

Lebesgue målt på $\mathbb{R}$:

Sæt $F(x) = x$, $x \in \mathbb{R}$ ovenstående sætning giver, at der eksisterer et entydigt bestemt mål, λ (el λ_1) på $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, som opfylder

$\lambda([a, b]) = b - a$, $\forall a \leq b \in \mathbb{R}$. Dette mål betegnes Lebesguemålet på $\mathbb{R}$.

Lebesgue-Stieltjes mål på $\mathbb{R}^k$

$$F: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\forall \{x_{1n}\}_{n \geq 1}, \{x_{2n}\}_{n \geq 1}, \dots, \{x_{kn}\}_{n \geq 1} \in \mathbb{R} \quad x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R} : x_{1n} \downarrow x_1, \dots, x_{kn} \downarrow x_k$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn}) = F(x_1, x_2, \dots, x_k) \quad (F \text{ 'højrekontinuer'})$$

$$\text{Lad } a = (a_1, \dots, a_k), b = (b_1, \dots, b_k) \in \mathbb{R}^k$$

$$\text{Definition: } a \leq b \iff a_j \leq b_j, j=1, \dots, k$$

$$a < b \iff a_j < b_j, j=1, \dots, k$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R}^k \mid a < x \leq b\}$$

$$\Delta_a^b F := \sum_{\epsilon_1=0}^1 \sum_{\epsilon_2=0}^1 \dots \sum_{\epsilon_k=0}^1 (-1)^{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_k} F(c_1(\epsilon_1), c_2(\epsilon_2), \dots, c_k(\epsilon_k)), \quad (\text{'the increment' + tiltaget})$$

$$\text{hvor } c_j(0) = b_j, c_j(1) = a_j, j=1, \dots, k$$

$$\text{Vi siger, at } F \text{ har positive tilvækster, hvis } \Delta_a^b F \geq 0, \forall a \leq b \in \mathbb{R}^k$$

$$\mathcal{F} := \{[a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}^k, a \leq b\}, \quad \mu([a, b]) = \Delta_a^b F$$

Påstand: Hvis $F: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ er højrekontinuer, har positive tilvækster, da eksisterer et entydigt bestemt mål, λ_F på $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, som opfylder

$$\forall a \leq b \in \mathbb{R}^k : \lambda_F([a, b]) = \Delta_a^b F$$

λ_F betegnes Lebesgue-Stieltjes målet induceret af F

Beweis:

Induktionsbevis, der benytter sætn. om Lebesgue-Stieltjes mål på $\mathbb{R}$ ved at betragte passende 'talpar'.

Sæt $F(x_1, \dots, x_k) = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k$, da følger af ovenstående sætn.

Påstand:

Der findes et entydigt bestemt mål, λ_k på $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, som opfylder

$$\forall a = (a_1, \dots, a_k) \leq (b_1, \dots, b_k) \in \mathbb{R}^k : \lambda_k([a, b]) = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \cdot \dots \cdot (b_k - a_k)$$

Eksistensen af Lebesguemålet på $\mathbb{R}$

Denne fremstilling er baseret på s. 28–34 i G.B. Folland's "Real Analysis" og på noter udarbejdet af Uffe Haagerup.

Vi kridter banen op med en generel diskussion om konstruktion af mål.

Definition 1 Et målrum $(X, \mathbb{E}, \mu)$ kaldes fuldstændigt, hvis alle μ -nulmængder ligger i $\mathbb{E}$.

Bemærk, at $(X, \mathbb{E}, \mu)$ er fuldstændigt, hvis og kun hvis det for alle $E \in \mathbb{E}$ med $\mu(E) = 0$, og alle $N \subseteq E$ gælder, at $N \in \mathbb{E}$. Af og til vil man sige, at μ er fuldstændigt i betydningen $(X, \mathbb{E}, \mu)$ er fuldstændigt, når X og $\mathbb{E}$ fremgår af sammenhængen.

Fuldstændige mål er diskuteret i opgaverne 3.15–3.18 i noterne. Fuldstændige mål er bekvemme at arbejde med, bl.a. p.g.a. følgende sætning, som til dels er bevist i Opgave 3.18.

Sætning 2 Lad $(X, \mathbb{E}, \mu)$ være et fuldstændigt målrum, og lad $(Y, \mathbb{F}, \nu)$ være et vilkårligt andet målrum (ikke nødvendigvis fuldstændigt). Hvis $f: X \rightarrow Y$ er $\mathbb{E}$ - $\mathbb{F}$ -målelig, og hvis $g: X \rightarrow Y$ opfylder $g = f$ μ -n.o., så er g også $\mathbb{E}$ - $\mathbb{F}$ -målelig.

Til ethvert målrum $(X, \mathbb{E}, \mu)$ kan man konstruere et nyt målrum $(X, \bar{\mathbb{E}}, \bar{\mu})$, som er fuldstændigt, og som opfylder $\mathbb{E} \subseteq \bar{\mathbb{E}}$ og $\bar{\mu}|_{\mathbb{E}} = \mu$ (se Opgave 3.17). Dette nye målrum kaldes *fuldstændiggørelsen* af $(X, \mathbb{E}, \mu)$. Det Lebesguesmål, vi nu skal konstruere, bliver automatisk fuldstændigt, så vi får ikke brug for denne fuldstændiggørelsesmaskine.

Konstruktionen af Lebesguemålet går via ydre mål. Disse er knapt så fine som mål, ved det, at de ikke nødvendigvis er tælleligt additive, men blot tælleligt subadditive:

Definition 3 Et ydre mål μ^* på en mængde X er en funktion $\mu^*: P(X) \rightarrow [0, \infty]$, som opfylder

- (i) $\mu^*(\emptyset) = 0$,
- (ii) $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$, hvis $A, B \in P(X)$ og $A \subseteq B$,
- (iii) $\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$ for enhver følge $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq P(X)$.

Til et ydre mål betragtes en særlig delfamilie af delmængder af X :

Definition 4 Lad μ^* være et ydre mål på mængden X . En delmængde E af X kaldes μ^* -målelig, hvis der for alle $A \in P(X)$ gælder

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E). \quad (1)$$

Definition 3 (iii) giver $\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E)$ for ethvert par $A, E \in P(X)$. Vi har derfor, at E er μ^* -målelig hvis og kun hvis den anden ulighed,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E), \quad (2)$$

gælder for alle $A \in P(X)$.

Definition 5 En familie $\mathcal{A}$ af delmængder af en mængde X kaldes en algebra, hvis

- (i) $X \in \mathcal{A}$,
- (ii) $A \in \mathcal{A}$ medfører $\mathbb{C}A \in \mathcal{A}$,
- (iii) $A, B \in \mathcal{A}$ medfører $A \cup B \in \mathcal{A}$.

Enhver σ -algebra er en algebra. Det modsatte gælder ikke, men vi har følgende lemma, hvis bevis overlades til læseren (= en opgave til øvelserne!):

Lemma 6 Lad $\mathcal{A}$ være en algebra på mængden X , og antag $\mathcal{A}$ er afsluttet under tællelige disjunkte foreninger, dvs. for alle følger $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ af parvis disjunkte mængder i $\mathcal{A}$ gælder $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Da er $\mathcal{A}$ en σ -algebra.

Theorem 7 (Carathéodory's Sætning) Lad μ^* være et ydre mål på en mængde X . Lad $\mathbb{E}$ være familien af alle μ^* -målelige delmængder af X . Lad μ være restriktionen af μ^* til $\mathbb{E}$, dvs. $\mu: \mathbb{E} \rightarrow [0, \infty]$ og $\mu(E) = \mu^*(E)$ for $E \in \mathbb{E}$.

Da er $(X, \mathbb{E}, \mu)$ et fuldstændigt målrum.

Bevis: Det skal vises, at $\mathbb{E}$ er en σ -algebra, at μ er et mål på $\mathbb{E}$, og at μ er fuldstændig. Det følger umiddelbart af (1), at $E \in \mathbb{E}$ medfører $\mathbb{C}E \in \mathbb{E}$, og at $\emptyset$ og X begge ligger i $\mathbb{E}$.

For $E, F \in \mathbb{E}$ og $A \in P(X)$ har vi

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E) \\ &= \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*(A \cap E \cap \mathbb{C}F) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E \cap F) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E \cap \mathbb{C}F) \\ &\geq \mu^*((A \cap E \cap F) \cup (A \cap E \cap \mathbb{C}F) \cup (A \cap \mathbb{C}E \cap F)) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}E \cap \mathbb{C}F) \\ &= \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}(E \cup F)). \end{aligned}$$

Dette viser, at $E, F \in \mathbb{E}$ medfører $E \cup F \in \mathbb{E}$. Det er nu vist, at $\mathbb{E}$ er en algebra.

Lad nu $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ være en følge af parvis disjunkte mængder beliggende i $\mathbb{E}$. Sæt $F_n = \bigcup_{j=1}^n E_j$, og bemærk, at $F_n \in \mathbb{E}$, da $\mathbb{E}$ er en algebra. Sæt $F = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j (= \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)$. Hovedslaget, der skal udkæmpes i dette bevis, består i at vise:

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F), \quad (3)$$

for alle $A \in P(X)$.

For at se (3), bemærk først

$$A = (A \cap F) \cup (A \cap \mathbb{C}F) = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A \cap E_j \right) \cup (A \cap \mathbb{C}F).$$

Sammen med Definition 3 (iii) giver dette

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F). \quad (4)$$

Omvendt, for alle $n \geq 2$ har vi

$$\mu^*(A \cap F_n) = \mu^*(A \cap F_n \cap E_n) + \mu^*(A \cap F_n \cap \mathbb{C}E_n) = \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \cap F_{n-1}).$$

Det følger heraf ved induktion, at

$$\mu^*(A \cap F_n) = \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap E_j),$$

for alle $n \geq 1$. (Til grundtrinnet $n = 1$ benyttes at $F_1 = E_1$.) Ved at benytte $\mathbb{C}F \subseteq \mathbb{C}F_n$ og (ii) i Definition 3 får vi

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F_n) \\ &= \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F_n) \\ &\geq \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F). \end{aligned}$$

Da dette gælder for alle $n \in \mathbb{N}$, har vi $\sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}F) \leq \mu^*(A)$. Sammen med (4) viser dette (3).

Det følger umiddelbart af (3), at $F \in \mathbb{E}$. Derfor er $\mathbb{E}$ afsluttet under tællelige disjunkte foreninger, så $\mathbb{E}$ er en σ -algebra jvf. Lemma 6. Sættes $A = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j (= F)$ i (3), får vi

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j).$$

(Husk at $\mu(E) = \mu^*(E)$ for $E \in \mathbb{E}$.) Dette viser, at μ er et mål på σ -algebraen $\mathbb{E}$. Vi mangler nu blot at vise, at μ er fuldstændig. Lad hertil $E \in \mathbb{E}$ og $N \subseteq E$ med $\mu(E) = 0$ være givet, og lad $A \in P(X)$. Da er

$$\mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap \mathbb{C}N) \leq \mu^*(E) + \mu^*(A) = \mu^*(A).$$

Betingelsen (2) er således opfyldt for N , så $N \in \mathbb{E}$. $\square$

Vi vender os nu til konstruktionen af Lebesguemålet på den reelle akse.

Et *h-interval* er et delinterval af $\mathbb{R}$ af formen $(a, b]$, (a, ∞) , eller $\emptyset$, hvor $-\infty \leq a < b < \infty$. Mængden af alle h-intervaller benævnes med $\mathbb{I}$.

Bemærk, at hvis I er et h-interval, så er $\mathbb{C}I$ en disjunkt forening af to h-intervaller, hvis $I = (a, b]$ og $-\infty < a < b < \infty$, og $\mathbb{C}I$ er selv et h-interval i alle andre tilfælde. Snitmængden af to h-intervaller er igen et h-interval.

Definer $\ell: \mathbb{I} \rightarrow [0, \infty]$ ved $\ell((a, b]) = b - a$, $\ell((a, \infty)) = \infty$, og $\ell(\emptyset) = 0$.

Definer $m^*: P(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$ ved

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_j) \mid I_j \in \mathbb{I}, \quad A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j \right\}. \quad (5)$$

Strategien er nu at vise, at m^* er et ydre mål, at alle h -intervaller er m^* -målelige, og at $m^*(I) = \ell(I)$ for alle h -intervaller I . Dette gøres i nedenstående lemmaer. Herefter giver Carathéodory's sætning det ønskede resultat om eksistensen af Lebesguemålet (Theorem 13).

Lemma 8 m^* er et ydre mål.

Bevis: Det skal vises, at (i), (ii) og (iii) i Definition 3 holder. (ii) er en umiddelbar konsekvens af definitionen af m^* (overvej dette!). (i) indses let ved f.eks. at vælge $I_1 = I_2 = I_3 = \dots = \emptyset$.

For at vise (iii), lad $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ være en vilkårlig følge i $P(\mathbb{R})$. Hvis $m^*(A_n) = \infty$ for mindst et n , så gælder uligheden $m^*(\bigcup_{n=1}^\infty A_n) \leq \sum_{n=1}^\infty m^*(A_n)$ trivielt. Antag derfor gerne, at $m^*(A_n) < \infty$ for alle n . Lad $\varepsilon > 0$. Find for alle n følger $\{I_{n,j}\}_{j=1}^\infty$ i $\mathbb{I}$, så

$$A_n \subseteq \bigcup_{j=1}^\infty I_{n,j}, \quad \sum_{j=1}^\infty \ell(I_{n,j}) \leq m^*(A_n) + 2^{-n}\varepsilon.$$

Da er $\{I_{n,j}\}_{j,n=1}^\infty$ en tællelig familie i $\mathbb{I}$, og

$$\bigcup_{j=1}^\infty A_n \subseteq \bigcup_{j,n=1}^\infty I_{n,j}, \quad \sum_{j,n=1}^\infty \ell(I_{n,j}) \leq \sum_{n=1}^\infty (m^*(A_n) + 2^{-n}\varepsilon) = \sum_{n=1}^\infty m^*(A_n) + \varepsilon.$$

Dette viser, at $m^*(\bigcup_{n=1}^\infty A_n) \leq \sum_{n=1}^\infty m^*(A_n) + \varepsilon$. Da dette holder for alle $\varepsilon > 0$ følger det ønskede: $m^*(\bigcup_{n=1}^\infty A_n) \leq \sum_{n=1}^\infty m^*(A_n)$. $\square$

Lemma 9 Alle h -intervaller er m^* -målelige.

Bevis: Lad I være et h -interval. Vi viser, at I er m^* -målelig ved at eftervise (2).

Lad $A \in P(\mathbb{R})$, og betragt hertil en vilkårlig følge $\{J_n\}_{n=1}^\infty$ af h -intervaller så $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty J_n$. Som tidligere bemærket er $\mathbb{C}I$ foreningen af to disjunkte h -intervaller I' og I'' (det ene af disse h -intervaller kunne være den tomme mængde). Sæt

$$K_n = I \cap J_n, \quad K'_n = I' \cap J_n, \quad K''_n = I'' \cap J_n.$$

Da er K_n, K'_n, K''_n parvis disjunkte h -intervaller, og $J_n = K_n \cup K'_n \cup K''_n$. Derfor er $\ell(J_n) = \ell(K_n) + \ell(K'_n) + \ell(K''_n)$ (overvej). Endvidere gælder

$$A \cap I \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty K_n, \quad A \cap I' \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty K'_n, \quad A \cap I'' \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty K''_n.$$

Samlet har vi

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^\infty \ell(J_n) &= \sum_{n=1}^\infty \ell(K_n) + \sum_{n=1}^\infty \ell(K'_n) + \sum_{n=1}^\infty \ell(K''_n) \\ &\geq m^*(A \cap I) + m^*(A \cap I') + m^*(A \cap I''), \end{aligned}$$

hvor $\geq$ skyldes (5). Da overdækningen $\{J_n\}_{n=1}^\infty$ af A var vilkårlig, kan vi igen ifølge (5) konkludere, at

$$\begin{aligned} m^*(A) &\geq m^*(A \cap I) + m^*(A \cap I') + m^*(A \cap I'') \\ &\geq m^*(A \cap I) + m^*(A \cap (I' \cup I'')) \\ &= m^*(A \cap I) + m^*(A \cap \mathbb{C}I). \end{aligned}$$

Det ses nu, at (2) er opfyldt, så I er m^* -målelig. $\square$

Lemma 10 *Hvis*

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n (a_j, b_j),$$

hvor $a \leq b$ og $a_j < b_j$ for $j = 1, 2, \dots, n$, så er

$$b - a \leq \sum_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

Bevis: Beviset føres ved induktion efter n . Overvej selv situationen for $n = 1$. Antag $n \geq 2$, at $[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n (a_j, b_j)$, og at påstanden i lemmaet er vist for alle overdækninger med færre end n intervaller. Find $j_0 \in \{1, 2, \dots\}$ så $a \in (a_{j_0}, b_{j_0})$. Hvis $b_{j_0} > b$, så er $[a, b] \subseteq (a_{j_0}, b_{j_0})$, og sagen er klar!

Antag $b_{j_0} \leq b$. Da er

$$[b_{j_0}, b] = [a, b] \setminus (a_{j_0}, b_{j_0}) \subseteq \bigcup_{j \neq j_0} (a_j, b_j).$$

Induktionsantagelsen giver derfor $b - b_{j_0} \leq \sum_{j \neq j_0} (b_j - a_j)$. Dermed har vi

$$\begin{aligned} b - a &= (b - b_{j_0}) + (b_{j_0} - a) \leq (b - b_{j_0}) + (b_{j_0} - a_{j_0}) \\ &\leq \sum_{j \neq j_0} (b_j - a_j) + (b_{j_0} - a_{j_0}) = \sum_{j=1}^n (b_j - a_j). \quad \square \end{aligned}$$

Lemma 11 *Lad $I, I_1, I_2, I_3, \dots$ være h -intervaller, således at $I \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty I_n$. Da gælder*

$$\ell(I) \leq \sum_{n=1}^\infty \ell(I_n).$$

Bevis: Hvis $I = \emptyset$, så er der intet at vise. Antag derfor gerne, at $I \neq \emptyset$. Endvidere, hvis $\ell(I_n) = \infty$ for mindst et n , så er der heller intet at vise. Vi kan derfor også antage, at $\ell(I_n) < \infty$ for alle n . Dvs. $I_n = (a_n, b_n]$, hvor $-\infty < a_n < b_n < \infty$ (idet vi også smider alle tomme mængder blandt intervallerne $I_1, I_2, \dots$ ud).

Bemærk, at

$$\ell(I) = \sup\{b' - a' \mid a', b' \in I, a' < b'\}, \quad (6)$$

når $I \neq \emptyset$. Lad $a', b' \in I$ med $a' < b'$ være givet.

Lad $\varepsilon > 0$, og sæt $a'_n = a_n$, og $b'_n = b_n + \varepsilon 2^{-n}$. Da er $I_n = (a_n, b_n] \subseteq (a'_n, b'_n)$, så $[a', b'] \subseteq I \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} (a'_j, b'_j)$. Da $[a', b']$ er kompakt giver Heine-Borel's sætning $[a', b'] \subseteq \bigcup_{j=1}^n (a'_j, b'_j)$ for et passende stort n .

Det følger nu fra Lemma 10, at

$$\begin{aligned} b' - a' &\leq \sum_{j=1}^n (b'_j - a'_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} (b_j + \varepsilon 2^{-j} - a_j) = \sum_{j=1}^{\infty} (\ell(I_j) + \varepsilon 2^{-j}) = \sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_j) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Da $\varepsilon > 0$ var vilkårlig, får vi $b' - a' \leq \sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_j)$, og da a', b' også var vilkårlige følger det ønskede af (6). $\square$

Lemma 12 For ethvert h -interval I er $m^*(I) = \ell(I)$.

Bevis: Sæt $I_1 = I$, $I_2 = I_3 = \dots = \emptyset$. Da er $I_1, I_2, I_3, \dots$ h -intervaller og $I \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, så

$$m^*(I) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) = \ell(I)$$

ifølge definitionen af m^* . Omvendt, hvis $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ er en følge af h -intervaller med $I \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, da er $\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \geq \ell(I)$ ifølge Lemma 11. Dette viser, at $m^*(I) \geq \ell(I)$. $\square$

Theorem 13 Der findes et fuldstændigt målrum $(\mathbb{R}, \mathbb{L}, m)$, som opfylder $\mathbb{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{L}$ og

$$m((a, b]) = b - a,$$

for alle a, b med $-\infty \leq a < b < \infty$.

Bevis: Lad $\mathbb{L}$ være mængden af alle m^* -målelige mængder, og lad m være restriktionen af m^* til $\mathbb{L}$. Carathéodory's sætning giver, at $(\mathbb{R}, \mathbb{L}, m)$ er et fuldstændigt målrum. Lemma 9 giver $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{L}$. Da σ -algebraen frembragt af $\mathbb{I}$ er lig med Borel- σ -algebraen $\mathbb{B}(\mathbb{R})$ (jvf. Opgave 1.2), så giver Sætning 1.2 i noterne, at $\mathbb{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathbb{I}) \subseteq \mathbb{L}$.

Endelig, hvis $-\infty \leq a < b < \infty$, så er $(a, b]$ et h -interval, og ved at udnytte Lemma 12 får vi

$$m((a, b]) = m^*((a, b]) = \ell((a, b]) = b - a. \quad \square$$

Ved at tage restriktionen af målet m til Borel- σ -algebraen $\mathbb{B}(\mathbb{R})$ får vi følgende korollar til Theorem 13:

Korollar 14 Der findes et mål m defineret på σ -algebraen $\mathbb{B}(\mathbb{R})$, som opfylder

$$m((a, b]) = b - a,$$

for alle a, b med $-\infty \leq a < b < \infty$.

Hovedsætning 5.1 i noterne siger, at målet m i Korollar 14 tillige er entydigt.

Mængderne i σ -algebraen $\mathbb{L}$ kaldes *Lebesguemålelige mængder*. Alle Borel-delmængder af $\mathbb{R}$ er således Lebesguemålelige. Det omvendte gælder ikke. Faktisk har vi

$$\mathbb{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathbb{L} \subsetneq P(\mathbb{R}). \quad (7)$$

Den første af disse ægte inklusioner kan ses ved en kardinalitetsbetragtning, idet $\text{card}(\mathbb{L}) = \text{card}(P(\mathbb{R}))$ og $\text{card}(\mathbb{B}(\mathbb{R})) = \text{card}(\mathbb{R})$. Den første af disse identiteter kan indses ved at benytte Cantor's mængde Z (se Eksempel 5.22 i noterne). Mængden Z er kompakt (og dermed $Z \in \mathbb{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{L}$), $m(Z) = 0$, og $\text{card}(Z) = \text{card}(\mathbb{R})$. Da $(\mathbb{R}, \mathbb{L}, m)$ er fuldstændig, har vi $P(Z) \subseteq \mathbb{L}$. Dette giver $\text{card}(P(\mathbb{R})) = \text{card}(P(Z)) \leq \text{card}(\mathbb{L}) \leq \text{card}(P(\mathbb{R}))$. Den anden kardinalitetsidentitet er noget mere kompliceret.

Den anden ægte inklusion i (7) følger umiddelbart af Vitali's Sætning (Sætning 5.30 i noterne).

Eksistensen af Lebesguemålet på $\mathbb{R}^k$ kan vises på en tilsvarende, men mere besværlig, måde. Istedet vil vi, når tiden er moden, konstruere Lebesguemålet på $\mathbb{R}^k$ ved at bruge teorien for produktmål, som udvikles i noternes §6.

En funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, hhv. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, kaldes *Lebesguemålelig*, hvis den er $\mathbb{L}\text{-}\mathbb{B}(\mathbb{R})$ -målelig, hhv. $\mathbb{L}\text{-}\mathbb{B}(\mathbb{C})$ -målelig.

Alle Borelfunktioner $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ og $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ er således Lebesguemålelige (da $\mathbb{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{L}$). Endvidere, hvis $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, hvis f er Lebesguemålelig, og hvis $f = g$ m.n.o., så er g Lebesguemålelig ifølge Sætning 2.

Lad $[a, b]$ være et kompakt delinterval af $\mathbb{R}$, og sæt

$$\mathbb{L}([a, b]) = \{E \cap [a, b] \mid E \in \mathbb{L}\} \quad (= \mathbb{L}_{[a, b]}).$$

Det kan (ret nemt) vises, at $([a, b], \mathbb{L}([a, b]), m)$ er et fuldstændigt målrum, og at $\mathbb{B}([a, b]) \subseteq \mathbb{L}([a, b])$. Bemærkning i afsnittet ovenfor sammen med den supplerende opgave på ugeseddel 6 kan bruges til at vise, at hvis $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ er Riemannintegrabel, så er $f \in \mathcal{L}([a, b], \mathbb{L}([a, b]), m)$, og

$$\int_{[a, b]} f dm = \int_a^b f(x) dx.$$

Med andre ord, $\mathcal{L}([a, b], \mathbb{L}([a, b]), m)$ indeholder alle Riemannintegrable funktioner $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, og Lebesgueintegralet stemmer overens med Riemannintegralet, når Riemannintegralet er defineret.

Der findes eksempler på Riemannintegrable funktioner, som ikke er Borelmålelige.

Målelige funktioner (1.38)

Et målrum, $(\Omega, \mathcal{F})$ er et 2-tupel, hvor Ω betegner en mængde, og $\mathcal{F}$ er en σ -algebra på Ω .

Lad $(\Omega, \mathcal{F})$, $(\Lambda, \mathcal{G})$ betegne to målrum og $f: \Omega \rightarrow \Lambda$ betegne en fkt.

Definition:

f siges at være målelig, hvis: $\forall G \in \mathcal{G}: f^{-1}(G) \in \mathcal{F}$

(betegnelser $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ -målelig, $\mathcal{F}$ -målelig, $\mathcal{G}$ -målelig benyttes også)

Hvis μ er et mål på $(\Omega, \mathcal{F})$, da siges en $(\mathcal{M}(\mu), \mathcal{G})$ -målelig fkt. at være μ -målelig. ($\mathcal{M}(\mu)$ som def. i 1.28)

Lad $f: \Omega \rightarrow \Lambda$ betegne en fkt. og $\mathcal{H}$ en broægning på Λ

Definer: $f^{-1}(\mathcal{H}) := \{f^{-1}(H) \mid H \in \mathcal{H}\}$

Med denne notation ser vi, at f er målelig hvis $f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{F}$

Lad $(\Omega, \mathcal{F})$, $(\Lambda, \mathcal{G})$, $(\Gamma, \mathcal{H})$ betegne målrum og lad $f: \Omega \rightarrow \Lambda$, $g: \Lambda \rightarrow \Gamma$ være målelige funktioner.

Påstand: $g \circ f: \Omega \rightarrow \Gamma$ er målelig.

Bevis:

Da g er målelig gælder at $g^{-1}(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{G}$

f er målelig, dvs. $f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{F}$; specielt har vi, at $f^{-1}(g^{-1}(\mathcal{H})) \subseteq \mathcal{F}$

Dvs. $f \circ g$ er målelig $\square$

Lad $f: \Omega \rightarrow \Lambda$ betegne en funktion, og $\mathcal{H}$ betegne en σ -algebra på Λ .

Påstand: $\sigma(f^{-1}(\mathcal{H})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{H}))$

Bevis:

$$\mathcal{F}_0 := f^{-1}(\mathcal{H}), \quad \mathcal{F} := f^{-1}(\sigma(\mathcal{H}))$$

Da $\mathcal{H} \subseteq \sigma(\mathcal{H})$ (pr. def. af $\sigma(\mathcal{H})$) gælder $f^{-1}(\mathcal{H}) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{H}))$

Jvf. P.3.1-3 er $f^{-1}(\sigma(\mathcal{H}))$ ikke-tom og (c, uc) -stabil (da $\sigma(\mathcal{H})$ er (c, uc) -stabil).

Dvs. $f^{-1}(\sigma(\mathcal{H}))$ er en σ -algebra indh. $f^{-1}(\mathcal{H})$.

Af 1.5.3 følger, at $\sigma(f^{-1}(\mathcal{H})) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{H}))$, dvs. $\sigma(\mathcal{F}_0) \subseteq \mathcal{F}$

Definer $\mathcal{H}_1 := \{B \in \Lambda \mid f^{-1}(B) \in \sigma(\mathcal{F}_0)\}$

Lad $B, \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{H}_1$

Af P.3.2. følger, at $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c \in \sigma(\mathcal{F}_0)$ da $\sigma(\mathcal{F}_0)$ er (c) -stabil og da vi jo har, idet $B \in \mathcal{H}_1$, at $f^{-1}(B) \in \sigma(\mathcal{F}_0)$.

$f^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n)$, jvf. P.3.1. Da, $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{H}_1$ og $\sigma(\mathcal{F}_0)$ er (uc) -stabil gælder, at $f^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \in \sigma(\mathcal{F}_0)$. P.3.3 giver desuden (da $\emptyset, \Omega \in \sigma(\mathcal{F}_0)$), at $\mathcal{H}_1$ er ikke-tom. Dvs. $\mathcal{H}_1$ er en σ -algebra.

$f^{-1}(\mathcal{H}) = \mathcal{F}_0 \in \sigma(\mathcal{F}_0)$ af def. på $\mathcal{H}_1$ ser vi, at $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}_1$

Af 1.5.3 følger, at (da $\mathcal{H}_1$ er en σ -algebra og $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}_1$) $\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{H}_1$

$$\Rightarrow f^{-1}(\sigma(\mathcal{H})) \subseteq f^{-1}(\mathcal{H}_1) \xRightarrow[\text{og } \mathcal{F}_0, \mathcal{F}]{\text{def. af } \mathcal{H}_1} \mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{F}_0)$$

Alt i alt kan vi konkludere, at $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$, eller $f^{-1}(\sigma(\mathcal{H})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{H}))$

□

Påstand:

Lad $(\Omega, \mathcal{F})$, $(\Lambda, \mathcal{G})$ betegne to målrum

$\mathcal{G}_0$ er en brøglægning på Λ , således at $\sigma(\mathcal{G}_0) = \mathcal{G}$ (1.38.6)

$f: \Omega \rightarrow \Lambda$ er mælelig $\iff \forall G_0 \in \mathcal{G}_0: f^{-1}(G_0) \in \mathcal{F}$

Bevis:

' $\implies$ '

f mælelig, dvs. $\forall G \in \mathcal{G}: f^{-1}(G) \in \mathcal{F}$, da $\mathcal{G}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{G}_0) = \mathcal{G}$ gælder specielt, at $\forall G_0 \in \mathcal{G}_0: f^{-1}(G_0) \in \mathcal{F}$.

' $\impliedby$ '

$\forall G_0 \in \mathcal{G}_0: f^{-1}(G_0) \in \mathcal{F} \implies f^{-1}(\mathcal{G}_0) \subseteq \mathcal{F}$

Da $\mathcal{F}$ er en σ -algebra, følger af 1.5.3, at $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G}_0)) \subseteq \mathcal{F}$,

men vi har lige vist, at $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G}_0)) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}_0))$.

$\mathcal{G}_0$ var valgt således, at $\sigma(\mathcal{G}_0) = \mathcal{G}$. Dvs $f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{F}$.

Det svarer jvf. tidl. arg. præcist til, at $f: \Omega \rightarrow \Lambda$ er mælelig. $\square$

Denne satn. er selvsagt meget nyttig til at tjekke om f er mælelig.

Istedet for at tjekke, at $f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{F}$, skal vi blot tjekke $f^{-1}(G_0) \in \mathcal{F}$,

for en brøglægning $\mathcal{G}_0$, som opfylder $\sigma(\mathcal{G}_0) = \mathcal{G}$.

Borel funktioner (1.39)

Hvis $(\mathcal{R}, d)$ betegner et metrisk rum, giver det jvf. kapitlet 'Borel σ -algebra' (1.8) mening, at tale om Borel σ -algebraen $\mathcal{B}(\mathcal{R})$ på $\mathcal{R}$, defineret som den mindste σ -algebra indeholdende alle åbne mængder (eller ækvivalent, jvf. 1.8, alle lukkede mængder).

Således er $(\mathcal{R}, \mathcal{B}(\mathcal{R}))$ et målrum

Fra og med dette kapitel er det underforstået, at vi pr. automatik betragter målrummet $(\mathcal{R}, \mathcal{B}(\mathcal{R}))$ hvis $(\mathcal{R}, d)$ er et metrisk rum.

Hvis $\mathcal{R}, \mathcal{A}$ er metriske rum (vi dropper notationen $(\mathcal{R}, d)$ og lader det være indforstået, at vi kan finde en 'passende' metrik), da siges en $(\mathcal{B}(\mathcal{R}), \mathcal{B}(\mathcal{A}))$ -målig funktion, f , at være Borel-målig. f siges desuden at være en Borelfunktion.

Eksempel: En Borel funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er en funktion fra $\mathbb{R}$ til $\mathbb{R}$ som er målig mht. Borel σ -algebraen $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ på $\mathbb{R}$.

Påstand: $f \in C^0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \Rightarrow f$ er en Borelfunktion

Bevis:

En funktion $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ er kontinuert hvis vi for en vilk. åben delmængde af $\mathbb{R}^m$, G har, at $f^{-1}(G)$ er åben i $\mathbb{R}^n$.

Da brolegn. af alle åbne mængder i $\mathbb{R}^m$, $\mathcal{G}$, opfylder $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ (1.8) følger af sætn. vist i kap. 'Målige funktioner' (1.38), at f er Borelmålig, da $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ genereres af alle åbne delmængder af $\mathbb{R}^n$. $\square$

Reelle funktioner (1.40)

$(\Omega, \mathcal{F})$ betegner et målrum.

$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ betegner en funktion.

Påstand: f målelig $\iff \forall a \in \mathbb{R}: \{f \leq a\} \in \mathcal{F}$

Bevis:

Af 1.10 'Borel σ -algebraen på $\mathbb{R}$ og $\mathbb{R}^k$ ' følger, at for $\mathcal{F} := \{F \subseteq \mathbb{R} \mid \exists a \in \mathbb{R}:]-\infty, a] = F\}$ gælder at $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Det ønskede følger af sætn. 1.38.6 i 'Målelige funktioner' $\square$

Påstand: Hvis $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ er målelig og $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er en Borel funktion, da er $g \circ f$ målelig.

Bevis:

Det ønskede følger direkte af sætningen om sammensætning af målelige funktioner i kap. 'Målelige funktioner' (1.38) $\square$

Sammenholdt med resultatet i 1.39, at enhver kont. funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er Borel-målelig, får vi bl.a., at hvis f betegner en målelig fkt. fra Ω ind i $\mathbb{R}$, har vi, at $f^2, \sin(f), e^f, \dots: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ er målelige funktioner.

Påstand:

Hvis $f_1, f_2, \dots: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ betegner målelige funktioner, gælder at

$$\sup_{n \geq 1} f_n, \inf_{n \geq 1} f_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

er målelige funktioner (fra Ω ind i $\mathbb{R}$)

Da $\mathcal{F}$ er $(\cup, \cap)$ -stabil (da $\mathcal{F}$ er en σ -algebra) fås

Lad $a \in \mathbb{R}$:

$$\left\{ \sup_{n \geq 1} f_n \leq a \right\} = \left\{ \forall n \geq 1: f_n \leq a \right\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n \leq a\} \in \mathcal{F}, \text{ da } \{f_n \leq a\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F}$$

$$\left\{ \inf_{n \geq 1} f_n \leq a \right\} = \left\{ \exists n \geq 1: f_n \leq a \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n \leq a\} \in \mathcal{F}, \text{ da } \text{---} \text{---}$$

Af den første sætn. i dette afsnit (1.40.1) følger, at $\sup_{n \geq 1} f_n, \inf_{n \geq 1} f_n$ er mælbare.

Da $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n := \inf_{p \geq 1} \left\{ \sup_{n \geq p} f_n \right\}$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \sup_{p \geq 1} \left\{ \inf_{n \geq p} f_n \right\}$ ser vi, jvf.

det netop viste, at $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ er mælbare. $\square$

Påstand:

Antag $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ er mælbare for alle $n \geq 1$, og at f_n konverger pkt.vis mod f , dvs. $\forall \omega \in \Omega: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\omega) = f(\omega)$; da er f mælbare.

Bevis:

Ifølge P.4.22 gælder at $\forall \omega \in \Omega: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\omega) = f(\omega)$ hvis $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = f$, men vi har i den foregående sætn. netop vist at $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ er mælbare under de givne omstændigheder $\square$

Grænsesætningen for målelige funktioner (1.41)

(M, d) betegner et metrisk rum, $(\Omega, \mathcal{F})$ betegner et måleligt rum
 $f_1, f_2, \dots$ er målelige funktioner fra Ω og ind i M .

Hvis $\forall \omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\omega) = f(\omega)$ ($f: \Omega \rightarrow M$, f en fkt.)

Da er f målelig.

Bevis:

$\mathcal{G} := \{G \subseteq M \mid G \text{ lukket}\}$ ifølge 1.8 gælder $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{B}(M)$

Lad $G \in \mathcal{G}$

Definer $\phi: M \rightarrow \mathbb{R} : \phi(x) := \inf_{y \in G} d(x, y) = d(x, G) \quad x \in M$.

Af P.S.20 følger (+ def. på kont.), at $\phi \in C^0(M, \mathbb{R})$

Af afsnit 1.39 'Borel funktioner' følger (da ϕ er kont.), at ϕ er (Borel) målelig.

Da f_n er målelig for alle $n \geq 1$, følger af 1.38.4 ('Målelige funktioner'), at $g_n := \phi \circ f_n$ er målelig for alle $n \geq 1$ ($g_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$). Definer $g := \phi \circ f$ ($g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$)

$$\forall \omega \in \Omega: g(\omega) = \phi(f(\omega)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(f_n(\omega)) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$$

Da $g_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ er målelig for alle $n \geq 1$, følger af 1.40.4 ('Reelle funktioner'), at $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$ er målelig. Af def. på, at g er målelig, vil dette sige:

$$\forall H \in \mathcal{B}(\mathbb{R}): g^{-1}(H) \in \mathcal{F} \quad (\text{husk de 'uskyndige' regler for notation indført i 1.39})$$

Specielt gælder, at $g^{-1}(0) \in \mathcal{F}$.

Ifølge P.S.21: $\phi^{-1}(0) = G$ (da G er lukket), da $g^{-1} = f^{-1}(\phi^{-1})$ har vi:
 $f^{-1}(G) \in \mathcal{F}$.

G var et vilk. element i $\mathcal{G}$, da $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{B}(M)$, følger af 1.38.6 ('Målelige fkt'), at f er målelig.

□

σ -algebraen genereret af funktioner (1.42)

Ω betegner en mængde, $(\mathcal{A}, \mathcal{G})$ betegner et målt rum

$\mathcal{F}$ betegner en σ -algebra på Ω , således at $f: \Omega \rightarrow \mathcal{A}$ er målelig.

Dvs. $f^{-1}(\mathcal{G}) \in \mathcal{F}$. $\mathcal{G}$ er pr. antagelse en σ -algebra af 1.38.5 (Målelige funktioner)

følger, at $f^{-1}(\mathcal{G})$ er en σ -algebra. (benyt, at da $\mathcal{G}$ σ -algebra: $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{G}$)

Af overvejelserne i 1.38 (Målelige funktioner) er det klart, at $f^{-1}(\mathcal{G})$ er den mindste σ -algebra på Ω som 'gør' f målelig.

Vi kan derfor (med rette) definere: $\sigma(f) := f^{-1}(\mathcal{G}) = \{f^{-1}(G) \mid G \in \mathcal{G}\}$

Antag, at $(\mathcal{A}_j, \mathcal{G}_j)$, $j=1, \dots, n$ er målelige rum; samt at $f_j: \Omega \rightarrow \mathcal{A}_j$, $j=1, \dots, n$ er funktioner.

Definer $\sigma(f_1, f_2, \dots, f_n) := \sigma\{f_j^{-1}(G_j) \mid j \in \{1, \dots, n\}, G_j \in \mathcal{G}_j\}$

$\sigma(f_1, \dots, f_n)$ er den mindste σ -algebra på Ω , som gør $f_1, \dots, f_n$ målelige.

σ -algebraen, vi leder efter, skal indeholde $f_j^{-1}(G_j)$, jf. def. af at f_j 'er' målelig for $j=1, 2, \dots, n$. (At $f_j^{-1}(G_j)$ er en σ -alg. for $j=1, \dots, n$ spiller ikke så betydelig en rolle som i tilfældet $n=1$, nu kan vi ikke direkte benytte en 'foreningsregl.' af $f_j^{-1}(G_j)$ -ene el. lign. som var kandidat, Vi går derfor tilbage til def. 1.5.3, som 'giver' det ønskede.

Endnu mere generelt og med samme 'arg!' har vi:

J betegner en mængde: $\forall j \in J$ betegner $(\mathcal{A}_j, \mathcal{G}_j)$ et målrum og $f_j: \Omega \rightarrow \mathcal{A}_j$ en fkt.
 $\sigma(f_j \mid j \in J) := \sigma\{f_j^{-1}(G_j) \mid j \in J, G_j \in \mathcal{G}_j\}$ er da den mindste σ -algebra som gør f_j målelig for alle $j \in J$.

Denne notation benyttes i det næste resultat...

Ω, J betegner mængder

For alle $j \in J$ betegner $(\mathcal{A}_j, \mathcal{F}_j)$ et måleligt rum og $f_j: \Omega \rightarrow \mathcal{A}_j$ en funktion $\mathcal{F} := \sigma(f_j \mid j \in J)$

$(\Gamma, \mathcal{H})$ betegner et måleligt rum og $g: (\Gamma, \mathcal{H}) \rightarrow (\Omega, \mathcal{F})$ en funktion

Påstand: g målig $\iff f_j \circ g$ er målig for alle $j \in J$.

Bevis:

' $\implies$ ':

g er $(\mathcal{H}, \mathcal{F})$ -målig. Udfra vort 'valg' af $\mathcal{F}$ og vort foregående resultat ser vi at f_j er målig for alle $j \in J$.

Af 1.38.4 ('Målige funktioner') følger, at $f_j \circ g$ er målig for alle $j \in J$ (Sammensætn. af målige funktioner er målig).

' $\Leftarrow$ ':

$f_j \circ g$ er målig for alle $j \in J$. Pga. vort 'valg' af $\mathcal{F}$ er det jvf. 1.38.4

('Målige funktioner') nok at tjekke, at $\forall j \in J, G_j \in \mathcal{F}_j: g^{-1}(f_j^{-1}(G_j)) \in \mathcal{H}$, (*)

Da $g^{-1}(f_j^{-1}(\cdot)) = (f_j \circ g)^{-1}(\cdot)$ og da $f_j \circ g$ var antaget at være målig for alle $j \in J$ er (*) opfyldt $\square$

Produkt σ -algebra (1.43)

$(\Omega_j, \mathcal{F}_j)$ betegner et måligt rum for $j=1, 2, \dots, n$

Produktmengden: $\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n := \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_1 \in \Omega_1, \dots, \omega_n \in \Omega_n\}$

Definer: $p_j: \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n \rightarrow \Omega_j$,

$p_j(\omega_1, \dots, \omega_n) := \omega_j$, for alle $j=1, \dots, n$ og $(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$

Produkt σ -algebraen: $\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_n := \sigma(p_1, \dots, p_n)$

$\forall A_1 \in \mathcal{F}_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}_n$:

$$p_j^{-1}(A_j) = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{j-1} \times A_j \times \Omega_{j+1} \times \dots \times \Omega_n \quad j=1, \dots, n$$

$$\bigcap_{j=1}^n p_j^{-1}(A_j) = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Af def. på $\sigma(p_j \mid j \in J)$ (dvs. $\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_n$) i kap. 1.42 (' σ -alg. genereret af fkt.'): følger, at $\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_n = \sigma\{A_1 \times \dots \times A_n \mid A_1 \in \mathcal{F}_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}_n\}$

$f: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_n)$ (f fkt.)

$f_j: \Omega \rightarrow \Omega_j$, $j=1, \dots, n$ således, at $f(\omega) = (f_1(\omega), \dots, f_n(\omega))$ for alle $\omega \in \Omega$.

Det er klart, at $(p_j \circ f) = f_j$, $j=1, \dots, n$.

[Af def. på $\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_n$ følger af 1.42.4 (' σ -alg. genereret af fkt.'): at
[f er målelig hvis f_j er målelig for $j=1, \dots, n$. [1.43.3]

(Ω_j, d_j) betegner et metrisk rum for $j=1, \dots, n$

Lad $w^* = (w_1^*, \dots, w_n^*)$; $\bar{w} = (w_1, \dots, w_n) \in \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$

Definer $d(w^*, \bar{w}) := \sqrt{\sum_{j=1}^n d_j(w_j^*, w_j)^2}$ ('produkt metrikken' - en metrik på $\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$ tjek evt. de tre betingelser)

Der gælder (kan evt. vises ved induktion), at (for givet $r > 0$)

$$b(w, r) \subseteq b(w_1, r_1) \times \dots \times b(w_n, r_n) \subseteq b(w, r \cdot \sqrt{n}) \quad (*)$$

(en 'indskrævet' kugle)
↑ (en 'kasse' med 'ligestore' sider)
↑ (en 'omskrevet' cirkel)

$$r_k^* := n^{-k/2} = \frac{1}{(\sqrt{n})^k} \quad k=1, 2, \dots \quad (+)$$

$$\mathcal{H} := \{b(w_1, r_1) \times \dots \times b(w_n, r_n) \mid r_i > 0, w_1 \in \Omega_1, \dots, w_n \in \Omega_n\}$$

Det er klart, at hvis $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ er separable metriske rum er $\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$ et separabelt metrisk rum. (tjek evt. i P.5)

Antag $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ separable metriske rum; med brug af (+) i (*), og udfra def. af $B(\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n)$, som den mindste σ -algebra indeholdende alle åbne mængder i $\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$, er det klart (jvf. *), at $\mathcal{H} \subseteq B(\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n)$, og af 1.9 ('Generation of Borel σ -algebra') følger derfor, at $\sigma(\mathcal{H}) = B(\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n)$. Af def. på $B(\Omega_1) \otimes \dots \otimes B(\Omega_n)$ (se foregående side), def. på $\mathcal{H}$ har vi dermed

$$B(\Omega_1) \otimes \dots \otimes B(\Omega_n) = B(\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n)$$

(Dette siger noget specielt om Borel σ -algebra)

Opsummering:

Specielt har vi for $\Omega_1, \dots, \Omega_n = \mathbb{R}$:

Hvis $f_1, \dots, f_n$ er mælbare fkt. fra $(\Omega, \mathcal{F})$ ind i $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$, da er $f(w) = (f_1(w), \dots, f_n(w))$ en mælbare fkt. fra $(\Omega, \mathcal{F})$ ind i $(\mathbb{R}^n, B(\mathbb{R}^n))$

Hvis $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ er en Borel fkt., da er $\varphi \circ f$ mælbare fkt. fra $(\Omega, \mathcal{F})$ ind i $(\mathbb{R}^k, B(\mathbb{R}^k))$. (Kan bruges til l. sammensætn. sætn. da $B(\Omega_1) \otimes \dots \otimes B(\Omega_n) = B(\Omega_1 \times \dots \times \Omega_n)$)
f.eks.: Hvis f_1, f_2 mælbare er $f_1 g, f_2 + \sqrt{g}, \dots$ mælbare.

Billedmål (1.44)

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ betegner et målrum (Ω en mængde, $\mathcal{F}$ σ -alg. på Ω , μ et mål på $(\Omega, \mathcal{F})$)

$(\Lambda, \mathcal{G})$ betegner et måleligt rum.

$f: \Omega \rightarrow \Lambda$ betegner en målelig funktion

Da er $\mu_f: \mathcal{G} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, $\forall G \in \mathcal{G}$ $\mu_f(G) := \mu(f^{-1}(G))$ veldefineret (da f målelig)

Påstand: μ_f er et mål på $(\Lambda, \mathcal{G})$

Bevis:

$\mathcal{G}$ er pr. antagelse en σ -algebra, dvs. $\emptyset \in \mathcal{G}$

$$\mu_f(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0 \quad \mu \geq 0 \text{ da } \mu \text{ mål på } (\Omega, \mathcal{F}) \Rightarrow \mu_f \geq 0$$

$\uparrow$ P.3.3 $\uparrow$ μ mål på $(\Omega, \mathcal{F})$

Lad $\{G_n\}_{n=1}^\infty$ disjunkte $\in \mathcal{G}$, da gælder, at $\bigcup_{n=1}^\infty G_n \in \mathcal{G}$, da $\mathcal{G}$ er en σ -algebra og $f^{-1}(G_n) \in \mathcal{F}$ for alle $n \geq 1$ og $f^{-1}(\bigcup_{n=1}^\infty G_n) \in \mathcal{F}$ da f er en målelig funktion.

$$\mu_f\left(\bigcup_{n=1}^\infty G_n\right) = \mu\left(f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^\infty G_n\right)\right) \stackrel{\text{P.3.1}}{=} \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty f^{-1}(G_n)\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(f^{-1}(G_n))$$

$\{G_n\}_{n=1}^\infty \text{ disjunkte} \Rightarrow \{f^{-1}(G_n)\}_{n=1}^\infty \text{ disjunkte}$
 $+ \mu \text{ mål på } \mathcal{F}$

Dvs. μ_f opfylder 1.1.4-5 og er dermed et mål på $\mathcal{G}$ $\square$

$g: (\Lambda, \mathcal{G}) \rightarrow (\Gamma, \mathcal{H})$ betegner en anden målelig funktion

Sammensætn. af målelige funktioner er målelig, dvs. $h := g \circ f$ er målelig.

Vi får, for $H \in \mathcal{H}$:

$$\mu_h(H) = \mu((g \circ f)^{-1}(H)) = \mu(f^{-1}(g^{-1}(H))) = \mu_f(g^{-1}(H)) = (\mu_f)_g(H)$$

Dvs. hvis $h = g \circ f$ er $\mu_h = (\mu_f)_g$ [1.44.3]

Simple og diskrete funktioner (1.45)

$(\Omega, \mathcal{F})$ betegner et målrigt rum

$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ betegner en funktion

f kaldes simpel, hvis $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$:

$$f = \sum_{j=1}^n a_j 1_{A_j}, \quad A_j = \{f = a_j\} \quad j=1, 2, \dots, n$$

$A_1, \dots, A_n$ er disjunkte mængder i $\mathcal{F}$ og $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$

f kaldes diskret, hvis $\exists \{a_n\}_{n=1}^\infty \in \mathbb{R}$.

$$f = \sum_{j=1}^\infty a_j 1_{A_j}, \quad A_j = \{f = a_j\} \quad j=1, 2, \dots$$

$A_1, A_2, \dots$ disjunkte mængder i $\mathcal{F}$ og $\Omega = \bigcup_{n=1}^\infty A_n$

Approximation af mælelige funktioner (1.46)

$(\Omega, \mathcal{F})$ betegner et måltigt rum

$f: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow \mathbb{R}$ betegner en vilkårlig mælelig funktion

Da gælder:

$\exists f_1, f_2, \dots$ diskrete funktioner fra Ω ind i $\mathbb{R}$

$\exists g_1, g_2, \dots$ simple funktioner fra Ω ind i $\mathbb{R}$, således at

$$\forall n \in \mathbb{N}, w \in \Omega: f_n(w) \leq f(w) \leq f_n(w) + 2^{-n}$$

$$\forall w \in \Omega: f_1(w) \leq f_2(w) \leq \dots \text{ og } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(w) = f(w)$$

(Dvs. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ er en 'voksende' følge af funktioner som konvergerer uniformt mod f .)

$$\forall w \in \Omega: \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = f \quad (\text{Dvs. } \{g_n\}_{n=1}^\infty \text{ konvergerer punktvis mod } f.)$$

Hvis $f \geq 0$ da gælder $0 \leq g_1 \leq g_2 \leq \dots$

Bevis:

Definer for alle $w \in \Omega$:

$$f_n(w) = 2^{-n} \cdot \text{int}(2^n \cdot f(w)), \quad g_n(w) = \begin{cases} n & , f_n(w) > n \\ f_n(w) & , |f_n(w)| \leq n \\ -n & , f_n(w) < -n \end{cases}$$

Hvis $k2^{-n} \leq f(w) < (k+1)2^{-n}$ (*) har vi, da $2^n \cdot k \cdot 2^{-n} = k$ og $2^n(k+1)2^{-n} = k+1$,

at $f_n(w) = 2^{-n}k$ (+). Ved at lade k gennemløbe de hele tal - og dermed 'dækker' den reelle akse med intervaller af typen (*) - ser vi, at f_n kan antage værdierne $\{0, \pm 2^{-n}, \pm 2 \cdot 2^{-n}, \pm 3 \cdot 2^{-n}, \dots\}$, dvs. f_n er diskret.

Af (*) og (+) ser vi, at $\forall w \in \Omega: f_n(w) \leq f(w) \leq f_n(w) + 2^{-n}$

$\Rightarrow 0 \leq f(w) - f_n(w) \leq 2^{-n}$ ved at lade $n \rightarrow \infty$ ser vi, at $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$

Lad $n \in \mathbb{N}$ være givet, der eksisterer for et givet $w \in \Omega$ et $k \in \mathbb{Z}$ (*), således:

$$k2^{-n} \leq f(w) < (k+1)2^{-n} \Rightarrow 2k2^{-(n+1)} \leq f(w) < 2(k+1)2^{-(n+1)}$$

Af dette og (+) ser vi, at $f_n(w) = 2^{-n}k$ mens $f_{n+1}(w) = \begin{cases} 2^{-(n+1)}(2k) & , 2k \leq 2^{n+1}f(w) < 2k+1 \\ 2^{-(n+1)}(2k+1) & , 2k+1 \leq 2^{n+1}f(w) < 2k+2 \end{cases}$

Heraf er det klart, at $f_n \leq f_{n+1}$.

Af def. på g_n og af (†) følger, at g_n kan antage værdierne $\{0, \pm 2^{-n}, \pm 2 \cdot 2^{-n}, \pm 3 \cdot 2^{-n}, \dots, (n \cdot 2^n) 2^{-n}\}$, dvs. g_n er simpel.

Ud fra def. af g_n og egenskaberne for f_n ser vi, at $\forall \omega \in \Omega$: $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(\omega) = f(\omega)$
samt, at hvis $f \geq 0$: $0 \leq g_1(\omega) \leq g_2(\omega) \leq \dots$

□

Funktioner på produktum (1.48)

$(S, \mathcal{A})$; $(T, \mathcal{B})$; $(M, \mathcal{M})$ betegner målelige rum

Lad $f: (S \times T, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (M, \mathcal{M})$ og lad $a \in S, b \in T$ være givet

Definer $\forall t \in T: f_a(t) := f(a, t)$; $\forall s \in S: f^b(s) := f(s, b)$

Da gælder: $f_a: T \rightarrow M$, $f^b: S \rightarrow M$ er målelige funktioner

Beweis:

Definer $p_a: T \rightarrow S \times T$ ved $\forall t \in T: p_a(t) = (a, t)$

For $A \times B \in S \times T$ har vi $p_a^{-1}(A \times B) = \begin{cases} B, & a \in A \\ \emptyset, & a \notin A \end{cases}$

Af def. på $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ (se evt. 1.43) og 1.38.6 i kap. 'Målelige funktioner' ser vi, at p_a er målelig.

Da sammensætning af målelige fkt. er målelig (1.38.4) og $f_a = f \circ p_a$, ser vi, at f_a er målelig.

En arg. for at f_b er målelig er helt analog med ovenstående $\square$

Notation: f_a, f^b kaldes de partielle funktioner for f $f(\cdot, b) := f^b$, $f(a, \cdot) := f_a$